

Анестезіологія та реаніматологія

1. Потерпілого доставлено після ДТП. При огляді: без свідомості, зіниці розширені, відсутній пульс на сонних артеріях та самостійне дихання. Що необхідно зробити в першу чергу фельдшеру “швидкої допомоги”?

- A.** Негайно розпочати СЛР
- B.** Виміряти АТ
- C.** Зняти ЕКГ
- D.** Покликати на допомогу лікаря
- E.** Транспортування у ВРІТ

2. При огляді хворого фельдшер “швидкої допомоги” констатував відсутність рухів грудної клітки, відсутність пульсу на сонній артерії, розширені зіниці без реакції на світло. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A.** Клінічна смерть
- B.** Коматозний стан
- C.** Преагональний період
- D.** Алкогольний делірій
- E.** Агонія

3. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта 42 років з діагнозом виразкова хвороба шлунку. Вдома виникло блювання, виділилось до 2-х літрів “кавової гущі”, стілець “мелена” вмістом до 1 л. При огляді хворого об’єктивно: шкіра холодна, бліда, АТ80/40мм рт.ст, ЧСС - 132 удара за хв. ЧД 24 за хв. ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

- A.** Гіповолемічний шок
- B.** Кардіогенний шок
- C.** Анафілактичний шок
- D.** Перфорація виразки шлунку
- E.** Гостре отруєння

4. Ви працюєте фельдшером ФАПУ, під час огляду у хворого 55 років з ішемічною хворобою серця раптово розвинулась клінічна смерть. Які ознаки характерні для клінічної смерті?

- A** Відсутність пульсу, розширення зіниць, припинення дихання
- B** Відсутність пульсу, звуження зіниць
- C** Ослаблене дихання з частотою 5-8 за 1 хв.
- D** Бурхливе дихання з частотою понад 40 за 1 хв.
- E** Рожевий відтінок шкіри

5. Під час проведення непрямого масажу серця грудина повинна продавлюватись приблизно на:

- A** 4-6 см
- B** 0,5-1 см
- C** 1-2 см
- D** 2-3 см
- E** 6-9 см

6. У потерпілого Л. 29 років була констатована клінічна смерть. М/с проводить серцево-легеневу реанімацію. Що в першу чергу свідчить про ефективність закритого масажу серця?

- A** Пульсація на сонній артерії
- B** Пасивні рухи грудної клітки
- C** Зниження температури тіла
- D** Відсутність свідомості
- E** Розширені зіниці

7. На місці дорожньо-транспортної пригоди виявлено потерпілу без свідомості, без дихання. Пульс, АТ не визначаються, зіниці на світло нереагують. Який термінальний стан у потерпілої?

- A** Клінічна смерть

- B** Передагональний стан
- C** Агонія
- D** Колапс
- E** Травматичний шок

8. У пацієнта Р, 43 р. Через 20 хвилин після введення 32 ОД інсуліну виникла загальна слабкість, пітливість, тремтіння кінцівок, серцебиття. Це характерно для:

- A** Стану гіпоглікемії
- B** Печінкової коми
- C** Гіперглікемічної коми
- D** Гіперосмолярної коми
- E** Гіперлактацедемічної коми

9. У хворого після введення пеніциліну через 5 хвилин раптово з'явилися різка слабкість, запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворого важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії фельдшера?

- A** Місце ін'єкції обколоти 0,1% адреналіну гідрохлориду
- B** Ввести еуфілін
- C** Ввести 20% розчин кофеїну
- D** Покласти грілку
- E** Ввести строфантин

10. Проводячи реанімаційні міроприємства на протязі 5 хв., Ви відмітили звуження зіниць, порожевіння шкірних покривів, відсутність самостійних серцевих скорочень та самостійного дихання. Які ваші подальші дії?

- A** Продовжувати реанімаційні міроприємства
- B** Припинити реанімацію
- C** Замінити дихання "рот до рота" ручними методами
- D** Припинити штучну вентиляцію легень, продовжити масаж серця
- E** Припинити реанімацію до повторного розширення зіниць

11. Фельдшера терміново викликали до хворого. Родичі відмітили, що вже 3-4 хвилини як не дихає. Шкіра бліда з ціанотичним відтінком. Серцебиття нема. Зіниці розширені. Як називається такий стан?

- A.** Клінічна смерть
- B.** Термінальна пауза
- C.** Біологічна смерть
- D.** Агонія
- E.** Соціальна смерть

12. Проводячи реанімаційні заходи протягом 15 хвилин, Ви відзначили звуження зіниць, почервоніння шкіри. Відсутні серцеві скорочення та самостійне дихання. Які Ваші подальші дії?

- A.** Продовжувати реанімаційні заходи
- B.** Припинити реанімацію
- C.** Ввести адреналін
- D.** Застосувати дихальний апарат
- E.** Продовжити реанімацію через 2 хв.

13. Дві хвилини тому робітник отримав удар електричним струмом. Хворий непритомний, пульс над сонною артерією не визначається, зіниці розширені, не реагують на світло. Дії фельдшера:

- A.** негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію
- B.** Розпочати непрямий масаж серця
- C.** Ввести в/в 0,1% розчин адреналіну
- D.** Провести оксигенотерапію
- E.** Чекати прибуття реанімаційної бригади

14. Ви фельдшер здоров'я пункту. Вас викликали в цех № 4, де пацієнт отримав електротравму. Об-
но: хворий блідий, дихання немає, пульс не визначається. Ваші першочергові дії з ПМД?

- A.** Терміново приступити до серцево-легеневої реанімації
- B.** Транспортувати постраждалого в лікарню
- C.** Внутрішньовенно ввести серцеві засоби
- D.** Застосувати дихальні аналептики та серцеві засоби
- E.** Знеболюючі

15. Пацієнтку готують до ургентної операції. За призначенням лікаря Вам необхідно підготувати
препарати для премедикації. Який препарат є обов'язковим для її проведення?

- A.** Атропін
- B.** Анальгін
- C.** Аміназин
- D.** Клофелін
- E.** Листенон