

## Дитячі інфекційні захворювання

1.

Етапність появи плямисто-папульозного висипу, енантема, плями Філатова-Копліка-Бельського - симптоми, які вказують на:

- A** \*Кір
- B** Скарлатину
- C** Менінгококову інфекцію
- D** Вітряну віспу
- E** Краснуху

2.

Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 10 років, що скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, блювання, сильний головний біль. Об'єктивно: на шкірі кінцівок та бокових частинах тулуба геморагічний висип зіркоподібної форми. Позитивні симптоми Кернінга та Брудзинського. Про яке захворювання свідчить дана симптоматика?

- A** \*Менінгококова інфекція
- B** Скарлатина
- C** Кір
- D** Вітряна віспа
- E** Червона висипка

3.

Фельдшер здоров'я оглядає дитину 4-х років. Скарги на підвищення температури тіла 38°C, висипання на шкірі, кволість. При огляді: дитина квола, шкіра бліда, на волосистій частині голови, обличчі, тулубі, поліморфний висип у вигляді плям, папул, везикул, наповнених прозорою рідиною. Дитина до захворювання відвідувала дитячий садок. Вкажіть термін карантину в даному випадку:

- A** \*21 день
- B** 5 днів
- C** 9 днів
- D** 14 днів
- E** 25 днів

4.

Фельдшер здоров'я оглядає дитину 6 років, що скаржиться на біль при відкриванні рота та жуванні, підвищення температури. При огляді стан середньої важкості, справа в ділянці завушної залози відмічається припухлість, вушна раковина відстовбурчена. При пальпації пухлина помірно болюча, шкіра над нею натягнута. Вкажіть термін ізоляції дитини в даному випадку:

- A** \*9 днів
- B** 5 днів
- C** 14 днів
- D** 21 день
- E** 25 днів

5.

Вас - фельдшера ФАПУ, викликали до дитини віком 1 рік, яка хворіє на ГРВІ. Скарги матері на неспокій дитини, сухий нав'язливий "гавкаючий" кашель, осиплість голосу, підвищення температури до 38,5°C. Відмічається інспіраторна задишка, дихання з втягненням податливих місць грудної клітки, роздуванням крил носа. Який з перерахованих препаратів Ви введете дитині?

- A** \*Преднізолон
- B** Ампіцилін
- C** Магнію сульфат
- D** Цефотаксим
- E** Контрикал

**6.**

Після проведення туберкулінодіагностики дитині п'яти років фельдшером ФАПу була виявлена вперше позитивна реакція Манту, без клінічних ознак. Якому стану це відповідає?

- A** \*Віражу туберкулінових проб
- B** Вродженій ваді серця
- C** Пневмонії
- D** Бронхіальній астмі
- E** Ревматичній хворобі

**8.**

Мати дитини 5 р. звернулася до фельдшера ФАПу зі скаргами на плями, дрібні папули різної величини та везикули, які розташовані на шії, обличчі, волосистій частині голови. Дитина млява, дратівлива,  $t^{\circ} - 37,7^{\circ}C$ . Для якого захворювання характерні вище названі симптоми?

- A** \*Вітряної віспи
- B** Кору
- C** Скарлатини
- D** Краснухи
- E** Менінгококкової інфекції

**9.**

До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною 10 років зі скаргами на збільшення задньошийних, потиличних лімфатичних вузлів, дрібно-плямистий висип на шкірі при субфебрильній температурі тіла. Якому захворюванню властиві ці симптоми?

- A** \*Краснусі
- B** Кору
- C** Вітряній віспі
- D** Скарлатині
- E** Алергічному дерматиту

**10.**

При огляді дитини 12 місяців фельдшер ФАПу оцінює місцеву реакцію після вакцинації БЦЖ. Які зміни повинні бути у місці щеплення?

- A** \*Рубчик
- B** Інфільтрат
- C** Пустула
- D** Виразка
- E** Везикула

**11.**

Мати дитини 5 років звернулася до фельдшера зі скаргами на те, що в дитини підвищилася температур тіла до  $38^{\circ}C$ , з'явився сухий кашель, переважно вночі, після кашлю - блювання. Щодня кашель частішає і складається із серії видихуваних поштовхів з глибоким свистячим вдихом. Напади кашлю до 10-15 разів на добу. Обличчя дитини набрякле. Крововиливи в склеру очей. Яку хворобу можна запідозрити:

- A** \*Кашлюк
- B** Пневмонія
- C** Стенозуючий ларинготрахеїт
- D** Обструктивний бронхіт
- E** Бронхіальна астма

**12.**

Дитині 5р. поставлено діагноз - дифтерія. Лікар призначив введення протидифтерійної сироватки за методом Безредко. Яким шляхом вводиться пробна доза сироватки?

- A** \*Внутрішньошкірно
- B** Підшкірно

- C* Внутрішньом'язово
- D* Внутрішньовенно
- E* Інгаляційно

**13.**

Дітям у школі проведена проба Манту. Через який проміжок часу необхідно оцінити її результати у дітей?

- A* \*72 год.
- B* 12 год.
- C* 24 год.
- D* 48 год.
- E* 56 год.

**14.**

Дитині виповнилося 5 років. Ви повині запросити матір з дитиною на ревакцинацію проти кору, паротиту, краснухи. В якому віці робиться це щеплення?

- A* \*6 років
- B* 7 років
- C* 14 років
- D* 15 років
- E* 18 років

**15.**

На 2-му тижні захворювання спостерігається пластинчасте луцення на долонях. Для якого захворювання це характерно?

- A* \*Скарлатини
- B* Кору
- C* Вітряної віспи
- D* Червоної висипки
- E* Менінгококової інфекції

**16.**

Дитина 1-го року життя перебуває в інфекційному відділенні на лікуванні з приводу колі-інфекції. Які випорожнення характерні для данного захворювання?

- A* \*Водянисті оранжевого кольору
- B* Пінисті темно-зеленого кольору
- C* У вигляді "січеного яйця"
- D* Кров'янисто-слизові
- E* У вигляді рисового відвару

**17.**

Яке профілактичне щеплення потрібно провести дитині в один місяць?

- A* \*Проти гепатиту В
- B* Проти кору, краснухи, паротиту
- C* БЦЖ
- D* АКДП
- E* Проти гемофільної інфекції

**18.**

Ви працюєте фельдшером ФАПУ. Через 2 тижні після перенесеної скарлатини до Вас звернувся хлопчик 12 років, який скаржиться на підвищення температури тіла до 37,5°C, набряки під очима, зменшену кількість сечі, яка набула червоного кольору. З якого дослідження треба розпочати обстеження дитини?

- A* \*Загального аналізу сечі
- B* Проби за Зимницьким

- C* Аналізу сечі на бактеріурію
- D* Проби за Нечипоренко
- E* Проби за Амбурже

**19**

Ви берете мазок на менінгокок у дитини 10 років. Які особливості проведення процедури?

- A* \*Мазок беруть ватним тампоном, закріпленим на стержні, зігнутому під кутом 45°
- B* Мазок беруть ватним тампоном, закріпленим на прямому стержні
- C* Мазок беруть з мигдаликів на межі здорової та ураженої тканини
- D* Мазок беруть після полоскання антисептичними розчинами
- E* Мазок беруть з носоглотки після їжі

**20.**

Під час госпіталізації дитини з менінгококовою інфекцією у неї почалися судоми. Який препарат слід ввести?

- A* \*Седуксен 0,05%
- B* Димедрол 1%
- C* 10% р-н глюконату кальція
- D* 0,9% р-н хлориду натрія
- E* 40% р-н глюкози

**21.**

Які клінічні прояви характерні для катарального періоду кору?

- A* \*Плями Бельського-Філатова-Копліка
- B* Поетапна висипка
- C* Пігментація
- D* Геморагічні висипання на шкірі
- E* Пластинчасте лущення

**22.**

При огляді дитини 5 років ви виявили погіршення стану, підвищення температури тіла, набряк у ділянці привушної слинної залози праворуч, відмову від їжі. Про яке захворювання слід думати?

- A* \*Паротитну інфекцію
- B* Краснуху
- C* Скарлатину
- D* Кір
- E* Вітряну віспу

**23.**

Наявність чистого носогубного трикутника на тлі дрібноточкового висипу на фоні гіперемованої шкіри при скарлатині носить назву:

- A* \*Симптом Філатова
- B* Симптом Керніга
- C* Симптом Копліка-Філатова-Бельського
- D* Симптом Хвостека
- E* Симптом Брудзинського

**24.**

Ви фельдшер ФАП. До вас звернулась мама 6-річної дитини зі скаргами на поганий апетит, схуднення, тривалий субфебрилітет. Об'єктивно: шкіра бліда, збільшені всі групи лімфатичних вузлів, проба Манту - папула 14 мм. Поставте попередній діагноз:

- A* \*Туберкульоз невстановленої локалізації
- B* Бронхіальна астма
- C* Хронічна пневмонія
- D* Залізодефіцитна анемія

**E** Гострий лейкоз

**25.**

На прийом до фельдшера ФАПУ прийшла мати з дитиною 8 років. Відмічається підвищення температури тіла, блювання, загальна слабкість, біль при ковтанні. При огляді виявлено гіперемію і набряк слизових зіву, мигдалики збільшені, вкриті сірим нальотом, який важко знімається. У календарі щеплень виявлено порушення термінів введення АКДП. Ваш орієнтовний діагноз?

**A** \*Дифтерія

**B** Епідемічний паротит

**C** Стоматит

**D** Ангіна

**E** Скарлатина

**26.**

Дітям перед ревакцинацією БЦЖ проведена проба Манту. Отримано такі результати: у 8 дітей - негативна проба, у 4 дітей - сумнівна проба, у 7 дітей - позитивна проба. Скільки дітей підлягають ревакцинації?

**A** \*8

**B** 4

**C** 7

**D** 12

**E** 19

**27.**

Ви працюєте фельдшером в школі. У дитини 7 років  $t^{\circ}$  -  $38^{\circ}\text{C}$ , біль в горлі, дрібно-точковий висип, блідий носо-губний трикутник, "малиновий язик". Вкажіть термін ізоляції хворого:

**A** \*22 дні

**B** 17 днів

**C** 9 днів

**D** 5 днів

**E** 25 днів

**28.**

Вкажіть максимальний інкубаційний період при краснусі:

**A** \*23 дні

**B** 14 днів

**C** 7 днів

**D** 5 днів

**E** 2 дні

**29.**

Назвіть термін проведення II ревакцинації поліомієлітною вакциною:

**A** \*6 років

**B** 18 місяців

**C** 8 місяців

**D** 2 роки

**E** 14 років

**30.**

При обстеженні дівчинки 9 років спостерігаються: головний біль, біль у горлі під час ковтання, температура -  $38,6^{\circ}\text{C}$ . На шкірі дрібнокраплинний, яскраво-рожевий висип на гіперемійованому тлі шкіри, крім носо-губного трикутника; язик малиновий, сосочки гіпертрофовані. Вкажіть найхарактернішу наявну проблему пацієнта, яка буде виявлена з боку шкіри при обстеженні через тиждень від появи шкірних симптомів:

**A** \*Пластинчасте лущення

- B** Везикули
- C** Плями
- D** Висип
- E** Пігментація

**31.**

Який характерний симптом спостерігають на 3 день висипання у разі захворювання на вітряну віспу?

- A** \*Поліморфізм висипу
- B** Плями Бельського-Філатова-Коплека
- C** Симптом Філатова
- D** Палаючий зів
- E** Афонія голосу

**32.**

Дитині 14 років, хворіє на епідемічний паротит 5 добу. Вранці знову підвищилася температура тіла. Скарги на біль в ділянці калитки і яєчка, біль під час сечовипускання. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:

- A** \*Орхіт
- B** Гострий пієлонефрит
- C** Гострий цистит
- D** Гостра затримка сечі
- E** Гідронефроз

**33.**

У новонародженої діагностовано пухирчатку. Які заходи слід запланувати для запобігання поширенню інфекції після госпіталізації?

- A** \*Ізоляція дитини, виділення для догляду за нею окремого персоналу
- B** Карантин на 21 день
- C** Ізолювати дитину не потрібно
- D** Провести щеплення проти пухирчатки
- E** Вологе прибирання без дезінфікуючих засобів

**34.**

Фельдшер ФАПу оглядає дитину 3 місяців, яка вчасно не була щеплена вакциною БЦЖ за наявними протипоказаннями. На даний час дівчинка здорова. Визначитеся з необхідністю щеплення дитини:

- A** \*Провести щеплення дитини після ретельного обстеження і негативної проби Манту
- B** негайно провести щеплення після ретельного обстеження дитини
- C** Провести щеплення після наступної планової вакцинації за календарем
- D** Провести щеплення дитини після ретельного обстеження і позитивної проби Манту
- E** Відкласти щеплення до виповнення дитині 7 років

**35.**

Фельдшер ФАПу доглядає дитину 5 років в перший день захворювання на скарлатину. При огляді: температура 38,8°C, блідість носо-губного трикутника. Які клінічні прояви можна ще виявити?

- A** \*"Палаючий" зів, дрібноточковий висип на тлі гіперемійованої шкіри
- B** Геморагічний висип зірчастої форми, судоми
- C** Плями Філатова-Копліка на слизовій оболонці, гнійна нежить
- D** Везикульозний висип на волосистій частині голови, схильність до носових кровотеч
- E** Пустульозний висип на гіперемійованій шкірі, гепатоспленомегалія

**36.**

Фельдшер ФАПУ оглядає хлопчика 12 років. Мати пояснює, що дитина скаржиться на біль в правому підребір'ї, жовтяничне забарвлення шкіри, темний колір сечі, знебарвлення випорожнень, швидку втомлюваність. При огляді: печінка збільшена, при пальпації рухлива, помірно болісна. Мати повідомила, що 3 місяці тому дитині видалили зуб. Про яке захворювання слід подумати:

**A** \*Вірусний гепатит В

**B** Гострий холецистит

**C** Дискінезія жовчовивідних шляхів

**D** Залізодефіцитна анемія

**E** Лейкоз

**37.**

У дитини 4,5 років підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , порушення загального стану, відмова від їжі, неспокій. На шкірі волосистої частини голови, обличчі, тулубі, кінцівках поліморфна висипка у вигляді папул, везикул, кірочок. Вкажіть етіотропний препарат для лікування при тяжкому перебігу даного захворювання:

**A** \*Ацикловір

**B** Тавегіл

**C** Цефтриаксон

**D** Фукорцин

**E** "Феністил"