

Гемостаз

1. Потерпілий збитий автомобілем. В нижній третині правої гомілки спостерігається рвана рана, з якої пульсуючої цівкою витікає яскраво-червона кров. Вкажіть найбільш ефективний метод спинення кровотечі в даному випадку.

- A.** *Накладання артеріального джгута
- B.** Давляча пов'язка
- C.** Тампонада рани
- D.** Максимальне згинання кінцівки в суглобі
- E.** Холод на рану, гемо статика

2. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До вас звернулася пацієнтка 42 р., котра 2 хв. тому отримала травму розбитим склом під час прибирання в шафі. Об'єктивно: на передньовнутрішній поверхні середньої третини плеча рана 4x0,9 см з рівними краями, з якої витікає яскраво-червона кров пульсуючим струменем. Вкажіть найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі.

- A.** *Накладання джгута
- B.** Тампонада рани
- C.** Максимальне згинання в суглобі
- D.** Давляча пов'язка
- E.** Підвищене положення кінцівки

3. Ви фельдшер ШМД, надаєте першу допомогу на місці події потерпілому, який внаслідок необережності поранив склом ліве передпліччя. При огляді в середній третині лівого передпліччя на передній поверхні глибока рана 4x1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Який метод тимчасової зупинки кровотечі Ви оберете у даному випадку?

- A.** *Давляча пов'язка
- B.** Згинання кінцівки в суглобі
- C.** Надання кінцівці підвищеного положення
- D.** Окклюзійна пов'язка
- E.** Пальцеве притискання артерії на відстані

4. Фельдшер ШД надає допомогу під час ДТП. У одного з постраждалих на гомілці є різана рана, з якої яскраво червоною, пульсуючою струминою витікає кров. Фельдшер максимально зігнув кінцівку в колінному суглобі. Але основним і оптимальним варіантом для подальшого транспортування хворого буде:

- A** *Накладання артеріального джгута
- B** Туга тампонада рани
- C** Пальцеве притиснення судини
- D** Введення в/м етамзилату
- E** Підвищене положення кінцівки

5. У пацієнта відкритий перелом, який супроводжується артеріальною кровотечею. Що найперше треба застосувати?

- A** *Кровоспинний джгут Есмарха
- B** Транспортну іммобілізацію
- C** Антисептичну пов'язку
- D** Кровоспинні засоби
- E** Знеболюючі

6. У хворого рвота "кавовою гущею", дьогтеподібні випорожнення, слабкість. Який попередній діагноз?

- A** *Шлунково-кишкова кровотеча
- B** Перфоративна виразка шлунка
- C** Гострий апендицит
- D** Защемлена грижа
- E** Геморой з кровотечею

7. Під час проходження практики студент електромеханічного коледжу поранив передпліччя на токарському станку. З рани пульсуючою цівкою витікає кров. Як тимчасово зупинити кровотечу, щоб доставити потерпілого в лікарню?

- A** *Накласти кровоспинний джгут
- B** Провести ПХО рани
- C** Накласти давлячу пов'язку
- D** Накласти міхур з льодом
- E** Провести тампонаду рани

8. У хворого відкритий перелом плеча, із рани пульсуючим струменем витікає кров яскраво-червоного кольору. З чого слід розпочати невідкладну допомогу?

- A** *Накладання джгута
- B** Введення серцево-судинних засобів
- C** Введення кровоспинних засобів
- D** Проведення транспортної іммобілізації
- E** Накладання тиснутої пов'язки

9. На ФАП доставили потерпілу, яка при падінні поранила собі руку склом. Хвора бліда. В середній третині плеча невелика рана, з якої струменем б'є яскравочервона кров. Назвіть першочергові заходи.

- A** *Накласти кровозупинний джгут вище місця кровотечі
- B** Накласти давлячу пов'язку після знеболення
- C** Накласти кровозупинний джгут нижче місця кровотечі
- D** Ввести заспокійливі і зробити ревізію рани
- E** Провести тампонаду рани стерильною серветкою

10. У жінки 50 років, хворої на варикозну хворобу нижніх кінцівок, внаслідок поранення виникла кровотеча. Кров темного кольору. Як зупинити кровотечу в даному випадку?

- A** *Накласти давлячу пов'язку
- B** Виконати тампонаду рани
- C** Ввести кровоспинні препарати
- D** Накласти джгут
- E** Надати підвищеного положення

11. Який найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі при кровотечі з стегнової артерії?

- A** *Накладання джгута
- B** Припідняте положення кінцівки
- C** Накладання судинного шва
- D** Накладання стисної пов'язки
- E** Закручування артерії

12. Постраждалому перед транспортуванням до лікарні наклали джгут, але термін накладання закінчився раніше госпіталізації. Що робити з потерпілим?

- A** *Джгут послабити, кровотечу спинити пальцевим притисканням, після відновлення кровообігу в кінцівці знову накласти джгут
- B** Продовжити транспортування з накладеним джгутом
- C** Джгут зняти, накласти давлячу пов'язку
- D** Джгут зняти, ввести кровоспинні засоби
- E** Ввести серцеві і продовжити транспортування