

Офтальмологія

1. Ви працюєте на фельдшерсько-акушерському пункті. До Вас звернувся пацієнт зі скаргами. Після обстеження пацієнта Ви встановили діагноз: Закритокутова глаукома. Гострий напад глаукоми. Оберіть групу препаратів, що використовують для лікування закритокутової глаукоми.

- A** Міотики
- B** Гормональні препарати
- C** Антибіотики
- D** Мідріатики
- E** Вітамінні краплі

2. Які прилади необхідні для вимірювання внутрішнього тиску на ФАПі при глаукомі?

- A** Тонometr Маклакова
- B** Офтальмометр
- C** Периметр
- D** Щелева лампа
- E** Гоніоскоп

3. Визначте діагноз хворому 50 років, який скаржиться на поступове зниження гостроти зору правого ока. Півроку тому був на прийомі в окуліста, було призначено закапування вітамінних крапель. Гострота зору ОД = 0,1; гострота зору OS = 0,8. Під час фокального обстеження під капсулою кристалика видно помутніння сірого кольору, яке сягає центру зіниці.

- A** Катаракта
- B** Глаукома
- C** Кон'юнктивіт
- D** Блефарит
- E** Дакріoadеніт

4. Хвора 40 років звернулася до фельдшера ФАПу зі скаргами на різке почервоніння, закидання правого ока, що з'явилося сьогодні вранці після сну. Об'єктивно: слизова оболонка повік та очного яблука різко гіперемійована, набрякла, багато гнійного виділення. Поставте діагноз.

- A.** Гострий кон'юнктивіт правого ока
- B.** Гострий приступ глаукоми
- C.** Хронічний дакріоцистит
- D.** Герпетичний деревовидний кератит
- E.** Міопія середнього ступеню

5. У хворого 67 років діагностовано початкова стадія старечої катаракти. Які методи лікування йому рекомендовані:

- A.** Медикаментозне
- B.** Хірургічне
- C.** Кріодеструкція
- D.** Лазеротерапія
- E.** Правильної відповіді немає

6. Після купання у ставку у пацієнта з'явилась сльозотеча, різі в очах, закидання очей. А вранці не зміг розплющити очі через склеювання вій. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Кон'юнктивіт
- B.** Блефарит
- C.** Дакріоцистит
- D.** Виразка рогівки
- E.** Катаракта

7. До фельдшера звернувся пацієнт зі скаргами на затуманення зору, райдужні кола при погляді на джерело світла, нудоту. Яке обстеження повинен провести фельдшер для встановлення діагнозу?

- A.** Вимірювання внутрішнього очного тиску

- B.** Визначення світловідчуття
- C.** Дослідження поля зору
- D.** Визначення рефракції
- E.** Дослідження гостроти зору

8. Для якого захворювання характерний симптомокомплекс: біль в оці, світлобоязнь, слъозотеча, перикоріальна ін'єкція, наявність інфільтрату на рогівці?

- A.** Кератит
- B.** Склерит
- C.** Іридоцикліт
- D.** Хоріодит
- E.** Кон'юктивіт

9. До Вас звернувся хворий зі скаргами на слъозотечу. Під час обстеження Ви виявили гіперемію кон'юнктиви, випинання у нижньо-внутрішньому куті орбіти, при натискання на яке із нижньої слізної крапки виділяється гній. Яка проблема у хворого?

- A.** Дакріоцистит
- B.** Кератит
- C.** Блефарит
- D.** Дакріаденіт
- E.** Кон'юктивіт