

Захворювання дітей раннього віку

1.

У дитини з народження спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий серцевий шум, що поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Така симптоматика діагностується при:

- A** *Природженій ваді серця
- B** Вегето-судинній дистонії
- C** Ревматизмі
- D** Малій хореї
- E** Інфекційному міокардиті

2.

У дитини в 3 місяця асиметрія голови, плоска потилиця, велике тім'ячко 4,5х5 см. Симптоми вказують на:

- A** *Рахіт
- B** Гіпервітаміноз Д
- C** Алергічний діатез
- D** Спазмофілію
- E** Гіпотрофію

3.

Мати дитини 6 місяців скаржиться фельдшеру ФАПУ, що дитина неспокійна, погано спить, пітніє. При об'єктивному обстеженні: виражені лобні та тім'яні горби, велике тім'ячко 3-4см, краї його потовщені. На ребрах "чотки", виражена м'язова гіпотонія, дитина погано спирається на ніжки. Про що свідчать дані симптоми?

- A** *Рахіт
- B** Екссудативно-катаральний діатез
- C** Гіпотрофія
- D** Диспепсія
- E** Гіпокальціємічний синдром

4.

Ви - фельдшер ФАПУ, проводите патронаж дитини віком 10 днів. Об'єктивно: легкий ціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей, шкіра бліда, акроціаноз. Під час аускультативної серця вислуховується грубий систолічний шум. З анамнезу стало відомо, що мати в перші місяці вагітності перенесла вітряну віспу. Яку хворобу Ви запідозрите у дитини?

- A** *Природжену вадю серця
- B** Спазмофілію
- C** Рахіт
- D** Асфіксію
- E** Бронхіт

5.

Фельдшер ФАПУ оглядає дитину віком 6 днів. На шкірі сідниць, стегон, природних складок і голови відмічаються дрібні, поверхневі пухирці розміром 1-2 мм в діаметрі, наповнені прозорим вмістом. Чим необхідно обробляти елементи висипу?

- A** *1-2% спиртовим розчином діамантового зеленого
- B** 3% розчином перекису водню
- C** Дитячим кремом
- D** Перевареною водою
- E** Елементи висипу не обробляти

6.

Ви - фельдшер ФАПУ, оглядаєте трьохмісячну дитину. Дитина млява, сонлива, відмічається пастозність обличчя, язик трохи висунутий, перенісся широке, шкіра бліда, суха, холодна на дотик. Зріст при народженні 50 см, у 3 місяці - 52 см. Яку патологію Ви запідозрите?

- A** *Вроджений гіпотиреоз
- B** Лімфатико-гіпопластичний діатез
- C** Рахіт
- D** Гіпертиреоз
- E** Хвороба Дауна

7.

Дитині, що народилася на 35 тижні вагітності з масою тіла 2000 г, фельдшер ФАПУ почне специфічну профілактику рахіту з:

- A** *2 тижневого віку
- B** 1 місячного віку
- C** 1,5 місячного віку
- D** 2 місячного віку
- E** 3 місячного віку

8.

Під час огляду новонародженого мати поскаржилася на почервоніння сідниць. При огляді фельдшер ФАПУ помітив різке почервоніння з ерозіями. Дитина постійно знаходиться в “Памперсах”, шкірні складки оброблюються присипками час від часу. Про яке захворювання треба подумати?

- A** *Попрілість
- B** Пітниця
- C** Піодермія
- D** Фізіологічна еритема
- E** Токсична еритема

9.

До фельдшера ФАПУ звернулася мати дитини 1 місяця зі скаргами на блювання “фонтаном” без домішок жовчі, має кислий запах. Дитина погано прибавляє в масі тіла. При огляді живота з’являється симптом “піщового годинника”. Визначіть попередній діагноз у дитини:

- A** *Пілоростеноз
- B** Пілороспазм
- C** Диспепсія
- D** Гострий гастрит
- E** Виразкова хвороба

10.

Дитина 3 місяців знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулася до фельдшера із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, за місяць набрала в масі 400 г. Дані симптоми дозволяють запідозрити:

- A** *Недогодовування
- B** Перегодовування
- C** Кишковий токсикоз
- D** Просту диспепсію
- E** Парентеральну диспепсію

11.

Під час патронажу новонародженої дитини віком 14 днів фельдшер виявив, що пупкова ранка волога з серозним виділенням. Про яке захворювання можна подумати?

- A** *Катаральний омфаліт
- B** Гнійний омфаліт
- C** Некротичний омфаліт
- D** Сепсис новонароджених
- E** Пупкову килу

12.

У хлопчика 5-ти років спостерігаються періодичне ацетонемічне блювання, нічні страхи, емоційна нестійкість. Об’єктивно: хлопчик пониженого харчування, астеничної тілобудови. інтелектуально

добре розвинутий, вмiє читати, по-дорослому пояснює життєвi ситуацiї. В сечi - сечокислi солi (урати) +++.

- Ця клiнiчна картина характерна для дiатезу:
- A** *Нервово-артритичного
 - B** Атопiчного
 - C** Ексудативно-катарального
 - D** Алергiчного
 - E** Лiмфатико-гiпопластичного

13.

При обстеженнi дiвчинки пiсля народження був виявлений крововилив на голiвi, який не виходить за межi однiєї кiстки, не пульсує, не болить. Яка патологiя у дитини?

- A** *Кефалогематома
- B** Септикопiемiя
- C** Пологова пухлина
- D** Пухирчатка новонародженого
- E** Внутрiшньочерепна травма

14.

У дитини 2-х мiсяцiв у паховiй дiлянцi спостерiгається гiперемована мокнуча поверхня шкiри внаслiдок злиття ерозiй. Яке захворювання можна запiдозрити?

- A** *Попрiлостi III ступеня
- B** Везикулопустульоз
- C** Пiтниця
- D** Попрiлостi I ступеня
- E** Пухирчатка новонародженого

15.

У дитини 9 мiс., яка хворiє на рахiт, з'явилось посмикування м'язiв обличчя з залученням iнших груп м'язiв. Про яке захворювання можна думати:

- A** *Явну спазмофiлiю, еклампсiю
- B** Явну спазмофiлiю, ларингоспазм
- C** Явну спазмофiлiю, карпопедальний спазм
- D** Приховану спазмофiлiю, симптом Хвостека
- E** Приховану спазмофiлiю, симптом Маслова

16.

У дитини 8 днiв шкiра землистого кольору, дихання слабке, поверхнєве, тахiкардiя, збiльшена печiнка, селезiнка. У дитини кровоточить пупок, спостерiгається зригування, нестiйкi рiдкi випорожнення. Про яке захворювання слiд думати:

- A** *Сепсис новонародженого
- B** Пневмонiю
- C** Геморагiчний омфалiт
- D** Гепатит
- E** Внутрiшньо- черепнупологову травму

17.

У 5-мiсячної дитини з явищами рахiту, пiд час крику наступила раптова зупинка дихання. Про яке захворювання свiдчить цей симптом?

- A** *Спазмофiлiю, ларингоспазм
- B** Стенозуючий ларинготрахеїт
- C** Спазмофiлiю, карпопедальний спазм
- D** Спазмофiлiю, еклампсiю
- E** Гiпервiтаміноз Д

18.

Якi можливи негативнi наслiдки вiдсмоктування слизу з ротової порожнини та носоглотки у

новонародженої дитини?

- A** *Розвиток аритмії та брадикардії
- B** Тахікардія
- C** Гіпертермія
- D** Експіраторна задишка
- E** Негативних наслідків не має

19.

Яку дозу вітаміну Д3 слід призначити дитині з ознаками рахіту І ст. важкості?

- A** *2000 ОД на добу
- B** 4000 ОД на добу
- C** 3000 ОД на добу
- D** 5000 ОД на добу
- E** 1000 ОД на добу

20.

Дитина 2міс., народилась у грудні, з масою тіла 3100 г, перебуває на природному вигодовуванні. Зараз маса тіла становить 4500 г, нервово-психічний розвиток відповідаєвіку. Патології внутрішніх органів немає. Яку профілактику рахіту слід призначити цій дитині?

- A** *Вітамін Д по 500 МО щоденно
- B** Вітамін Д по 200 МО на добу
- C** Аскорбінова кислота по 30 мг з рази на добу
- D** Жовток курячого яйця
- E** Кальцію глюконат по 400-500 мг на добу

21.

Дитина від доношеної вагітності народилась з масою тіла 3200 г. На 1-шу добу після народження з'явилась жовтяниця. Печінка і селезінка збільшені. Білірубін - 100 мкмоль/л. Група крові матері В (III) Rh (-), дитини - 0 (I) Rh (+). Який діагноз у цьому випадку найбільш ймовірний?

- A** *Гемолітична хвороба новонароджених
- B** Фізіологічна жовтяниця
- C** Вроджений гепатит
- D** Атрезія жовчовивідних шляхів
- E** Сепсис новонароджених

22.

Дитина, 9 міс. При об'єктивному обстеженні шкіра бліда, суха, вяла. Тургор тканин значно знижений. М'язова гіпотонія. Підшкірно-жирова клітковина на животі і кінцівках відсутня. Дефіцит ваги - 25%. Поставте попередній діагноз:

- A** *Гіпотрофія II ступеню
- B** Гіпотрофія I ступеню
- C** Гіпотрофія III ступеню
- D** Паратрофія
- E** Нормотрофія

23.

Етіологічним чинником захворювання, яке розвивається у новонароджених і грудних дітей і називається пліснявкою, є:

- A** **Candida albicans*
- B** Стафілокок
- C** Стрептококк
- D** Вірус звичайного герпесу
- E** Вірус вітряної віспи

24.

Фельдшер запідозрив латентну форму спазмофілії. Який симптом характерний для данного захворювання?

- A** *Хвостека
- B** Керніга
- C** Брудзинського
- D** Ортнера
- E** Кера

25.

Ви працюєте фельдшером ФАПУ. У дитини 3 місяців асиметрія голови, плоска потилиця, велике тім'ячко 4,0 x 3,5 см., краї пом'якшені. Дані симптоми вказують на:

- A** *Рахіт
- B** Гіпервітаміноз Д
- C** Спазмофілію
- D** Нервово-артритичний діатез
- E** Ексудативно-катаральний діатез

26.

Ви працюєте фельдшером ФАПУ. Визначте профілактичну добову дозу вітаміну Д для здорової доношеної дитини:

- A** *500 ОД
- B** 200 ОД
- C** 800 ОД
- D** 1000 ОД
- E** 1600 ОД

27.

Ви фельдшер ФАПУ. Відбулися пологи вдома. Після народження дитини спостерігають жовтяничне забарвлення навколишньо-плодних вод і пупкового канатика, жовтяниця у дитини швидко наростає. У матері резус-фактор (-), у дитини (+). Який попередній діагноз можна поставити?

- A** *Жовтянична форма ГХН
- B** Анемічна форма ГХН
- C** Набрякова форма ГХН
- D** Сепсис новонароджених
- E** Асфіксія новонароджених

28.

Фельдшер оглянув новонароджену дитину після пологів вдома. При огляді новонародженої дитини на першій хвилині життя ЧСС становить менше 100/хв., дихання нерегулярне, акроціаноз, рефлекси слабкі, тонус м'язів знижений. Який ймовірний діагноз може поставити фельдшер?

- A** *Асфіксія новонароджених
- B** Колапс
- C** Пологова травма
- D** Гемолітична хвороба новонароджених
- E** Пневмонія

29.

Фельдшер у дитини 3-х місячного віку виявив такі симптоми: підвищену пітливість, облісіння потилиці, помірний краніотабес. Для якого періоду рахіту вони характерні?

- A** *Початковий
- B** Розпалу
- C** Залишкових явищ
- D** Реконвалесценції
- E** Термінального

30.

Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту. Яку з нижче перерахованих ванн треба обрати?

- A** *З додаванням морської солі
- B** З додаванням відвару ромашки

C З додаванням відвару дубової кори

D З додаванням крохмалю

E З додаванням відвару череди

31.

До фельдшера ФАПу звернулася мати дитини 10 місяців з діагнозом: “рахіт, період розпалу, гострий перебіг”, якій педіатр призначив вітамін Д. Мати запитує, як довго потрібно давати лікувальну дозу вітаміну Д:

A *Протягом 35-40 діб

B Протягом 40-60 діб

C Протягом 5-10 діб

D Протягом 10-14 діб

E Протягом 2-5 діб

32.

У недоношеної дитини з масою тіла при народженні 1900 г під час годування виник приступ апное, але ціанозу і брадикардії не спостерігається. Що буде першочерговим у наданні невідкладної допомоги дитині?

A *Тактильна стимуляція вздовж спини

B негайно розпочати ШВЛ

C Розпочати зігрівання

D Перевірити рівень глюкози в крові

E Постійно підтримувати правильне положення

33.

Хлопчику 4-х років з відставанням у фізичному розвитку та встановленої залізодефіцитної анемії з рівнем гемоглобіну 90 г/л призначено комплексне лікування, зокрема - препаратами заліза. Протягом якого періоду фельдшер ФАПу буде спостерігати за лікуванням дитини?

A *6 місяців

B 2 місяці

C До нормалізації рівня гемоглобіну

D 1 рік

E 2 роки

34.

У 6-місячного малюка при огляді спостерігається ціаноз губ, задишка під час годування і плачу. Додаткове обстеження в кардіологічному відділенні підтвердило діагноз вродженої вади серця. В бесіді з мамою фельдшер визначає, що критичний період формування вади серця протягом вагітності становить:

A *2-8 тиждень

B На 1-му тижні

C Після 12 тижнів

D 18-20 тижнів

E 30-32 тижні

35.

При огляді фельдшером дитини 6 міс на волосистій частині голівки, бровах виявлені лусочки лимонно-жовтого кольору з масними кірочками. Як пояснює фельдшер цей симптом?

A *Гнейс

B Молочний струп

C Попрілості

D Пітниця

E Строфулюс

36.

Під час патронажу до новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природних

складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз:

A *Везикулопустульоз

B Псевдофурункульоз

C Пухирчатка новонароджених

D Екسفоліативний дерматит Рігтера

E Попрілості