

Захворювання та ушкодження голови, обличчя і шиї.

1. До Вас у медпункт заводу доставили робочого, який внаслідок необережності отримав черепно-мозкову травму. Що необхідно застосувати для профілактики набряку головного мозку?

- A.** *Міхур з льодом на голову
- B.** Анальгетики
- C.** Гіпотензивні засоби
- D.** Наркотичні засоби
- E.** Судинно-розширювальні засоби

2. Потерпілий після ДТП. При огляді на місці пригоди Ви виявили криваву лікворею з вух та носа. Що можна запідозрити у хворого?

- A.** *Перелом основи черепа
- B.** Забій головного мозку
- C.** Стиснення головного мозку
- D.** Струс головного мозку
- E.** Перелом склепіння черепа

3. Працівник виробництва впав з п'ятиметрової висоти. Фельдшер здоров'я пункту прибув на місце події. Потерпілий без свідомості, дихання поверхневе, з носа і вух витікає рожева рідина. Що з потерпілим?

- A.** *Перелом основи черепа
- B.** Перелом склепіння черепа
- C.** Перелом кісток носа
- D.** Перелом нижньої щелепи
- E.** Перелом верхньої щелепи

4. Каково наиболее опасное осложнение при повреждении вен шеи, а особенно яремной вены?

- A.** *Воздушная эмболия
- B.** Нагноение раны
- C.** Эвентрация
- D.** Развитие тромбообразования
- E.** Болевой шок

5. Жінка 27 років послизнулася на катку, впала, втратила свідомість на 2 хвилини. Після відновлення свідомості скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, шум у вухах. Життєво важливі функції без відхилень. Який стан визначить фельдшер в діагнозі?

- A.** *Струс головного мозку
- B.** Забій головного мозку
- C.** Стиснення головного мозку
- D.** Перелом основи черепа
- E.** Перелом кісток склепіння черепа

6. У хворого С., 48 р, через 4 години після отриманої черепно-мозкової травми з'явився сильний головний біль, блювота, ознаки правостороннього геміпарезу з чим пов'язані проблеми хворого?

- A.** *Здавлення головного мозку гематомою
- B.** Забій головного мозку
- C.** Струс головного мозку
- D.** Гострий менінгіт
- E.** Забій м'яких тканин голови

7. На ФАП привезли хворого. Потерпілий з черепно-мозковою травмою. Свідомість відсутня, крововилив у навколоочну клітковину, з носа виділяється кров та ліквор, з вух витікання ліквору. АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps – 50/хв.. Поставте попередній діагноз?

- A.** *Перелом основи черепа

- B** Струс мозку
- C** Стиснення мозку
- D** Перелом кісток носа
- E** Перелом кісток склепіння черепа

8. Ви працюєте фельдшером ФАПУ. До Вас звернувся пацієнт 30 років, на потиличній поверхні шиї утворився інфільтрат, який піднімається над поверхнею шкіри. Шкіра в цьому місці має багряно-синій колір. Множинні гнійники об'єднуються в єдиний гнійно-некротичний конгломерат. Що із перерахованого являється найбільш прийнятним втручанням при цьому захворюванні?

- A** *Оперативне лікування
- B** Застосування антибіотиків широкого спектру дії
- C** Ультрафіолетове опромінювання
- D** Сульфаніламідні препарати
- E** Обколювання навколо карбункула 0,5 % розчином новокаїну

9. Чоловік 35 років в бійці отримав удар по голові, знепритомнів. На час прибуття фельдшера швидкої допомоги постраждалий без свідомості, в ділянці скроневої кістки забита рана 4x5 см, сильно кровоточить; кровотеча та лімфорея з вух та носа. Який стан визначить фельдшер в діагнозі?

- A.** *Перелом основи черепа
- B.** Перелом кісток склепіння черепа
- C.** Забита рана м'яких тканин голови
- D.** Струс головного мозку
- E.** Забій головного мозку

10. Ви обідаєте в їдальні підприємства, на якому працюєте фельдшером здоров'я. Поруч з Вами потерпілий раптово перервав енергійну розмову на півслові, підхопився на ноги, руки судомно охоплюють шию, обличчя синіє і набрякає на очах. Що необхідно зробити в першу чергу?

- A.** *Застосувати прийом Геймліха
- B.** Здійснити трахеотомію
- C.** Провести штучну вентиляцію легень
- D.** Ударити потерпілого між лопатками
- E.** Намагатись проштовхнути стороннє тіло глибше в дихальні шляхи

11. У пацієнта поранення черепа з вибуханням головного мозку. Шкіру навколо рани обробили йодонатом, на вибухання наклали стерильну серветку з ізотонічним розчином. Що ще необхідно накласти, щоб не відбулося стиснення головного мозку?

- A.** *Стерильний ватно-марлевий бублик
- B.** Шину Крамера
- C.** Стерильний ватно-марлевий тампон
- D.** Шину Єланського
- E.** Шину Бакшеєва

12. Потерпілий без свідомості, відмічається лікворея та кровотеча з вуха та носа, брадикардія. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** *Перелом основи черепа
- B.** Стиснення мозку
- C.** Струс головного мозку
- D.** Перелом склепіння черепа
- E.** Забій головного мозку

13. Ви фельдшер здоров'я, доставлено потерпілого з переломом основи черепа. Виберіть основний симптом:

- A.** *Кровотеча і лікворея з носа та вуха

- B.** Наявність крововиливу на потилиці
- C.** набряк шії
- D.** Головний біль
- E.** Кровотеча з рани на голові

14. Через падіння з драбини пацієнт отримав черепно-мозкову травму, непритомний, періодично виникає блювання. У неврологічному статусі визначаються менінгеальні симптоми. Як потрібно транспортувати пацієнта:

- A.** *У горизонтальному положенні на ношах, повернути голову хворого на бік
- B.** У положенні сидячи
- C.** У горизонтальному положенні лежачи на животі
- D.** У горизонтальному положенні на м'якій поверхні, повернути голову хворого на бік
- E.** У горизонтальному положенні, фіксувавши кінцівки лонгетами

15. На ФАП з вулиці доставлено чоловіка 45 років без свідомості. При огляді: обличчя в крові, у тім'яній ділянці рана, що кровоточить. При обережній пальпації відчуються краї кісткових відломків. У рані стирчить кістка. Вкажіть попередній діагноз:

- A.** *Відкрита черепно-мозкова травма
- B.** Закрита черепно-мозкова травма
- C.** Перелом основи черепа
- D.** Стиснення головного мозку
- E.** Забій голови

16. Молодий чоловік під час прийому їжі раптово схопився за шию, рот відкритий, дихання неможливе, ціаноз, відсутні голос та кашель. Які заходи необхідно провести в першу чергу.

- A.** *Використати метод Геймліха
- B.** Розпочати серцево-легеневу реанімацію
- C.** Ввести зонд в шлунок
- D.** Придати хворому горизонтальне положення
- E.** Запрокинути голову доверху