

Захворювання та ушкодження грудної клітки і органів грудної порожнини.

1. До фельдшера здоров'я пункту промислового підприємства звернувся робітник 32 років, який скаржиться на біль в ділянці середньої третини лівої ключиці. Біль виник внаслідок падіння, коли чоловік йшов на роботу. Об'єктивно: стан задовільний, відмічається деформація в зоні ушкодження. При пальпації: локальна болючість, крепітація та патологічна рухливість відломків. Яке ушкодження у робітника?

- A.** *Перелом ключиці
- B.** Вивих плеча
- C.** Забій плечового суглобу
- D.** Артрит плечового суглобу
- E.** Розтягнення зв'язок

2. Після автомобільної аварії потерпілий скаржиться на біль у грудній клітці, неможливість глибокого вдиху, задишку. При огляді: обличчя бліде, в лівій половині грудної клітки рана, з якої при видиху виділяється піниста кров. Вкажіть попередній діагноз:

- A** *Пневмоторакс
- B** Відкритий перелом ребер
- C** Поранення серця
- D** Поранення м'яких тканин
- E** Поранення легені

3. У молодого чоловіка 20-ти років ножове поранення грудної клітки. Положення вимушене, праворуч у V міжребер'ї різана рана розміром 3x1 см, з якої витікає піниста кров, а під час вдиху чути всмоктування повітря. Для попередження розвитку синдрому кардіопульмональних порушень фельдшер на місці події повинен:

- A** *Накласти оклюзійну пов'язку, ввести протишокові препарати
- B** Ушити рану, ввести знеболювальні
- C** Зупинити кровотечу, ввести етамзилат
- D** Дренувати плевральну порожнину, ввести серцеві препарати
- E** Провести оксигенотерапію і новокаїнову блокаду

4. До фельдшера здоров'я пункту звернувся чоловік 37 років, який отримав травму на виробництві. Скаржиться на сильний біль в правій половині грудної клітки, який посилюється при кашлі, диханні та зміні положення тіла. При пальпації визначається біль в ділянці 3-4 ребер по середньо-ключичній лінії справа, патологічна рухливість та крепітація, наявні садна та крововиливи на шкірі. Який діагноз визначить фельдшер?

- A** *Перелом ребер
- B** Забій грудної клітки
- C** Закритий пневмоторакс
- D** Відкритий пневмоторакс
- E** Гемоторакс

5. При огляді хворого Р., 38 років з ножовим пораненням грудної клітки фельдшер виявив, що рана "дихає" - чути "свист", а в момент вдиху повітря виходить із рани, при видиху - заходить в плевральну порожнину. Яке ускладнення виникло у хворого ?

- A** *Відкритий пневмоторакс
- B** Клапанний пневмоторакс
- C** Перелом ребер
- D** Поранення серця
- E** Закритий пневмоторакс

6. Потерпілий має поранення ножом у грудну клітку. Наявність яких ознак вимагає застосування оклюзійної пов'язки ?

- A** *Клекотання на вдиху і видиху
- B** Кровотеча з рани
- C** Біль при диханні
- D** Блювання кров'ю
- E** Гавкаючий кашель

7. Ви працюєте фельдшером ФАПУ. До Вас доставлена дитина, 11 років, після падіння з дерева скаржить на біль у грудній клітці, кашель, задишку. Об'єктивно: шкіра бліда, покрита холодним потом, в ділянці 6-7 ребер справа – невелика рана, пальпація різко болюча, при перкусії притуплення легеневого звуку, дихання послаблене. Назвіть спосіб транспортування.

- A** *Напівсидячи
- B** На спині
- C** На боці
- D** На животі
- E** На спині в позі жаби

8. Ви працюєте фельдшером ФАПУ. До Вас звернулася жінка 28 років, Ви виявили в лівій молочній залозі щільне утворення з горіх, має чіткі контури, безболісне. Лімфовузли не збільшені. Що з переліченого імовірніше за все Ви повинні виконати?

- A** *Направити до хірурга
- B** Накласти пов'язку
- C** Не звертати уваги
- D** Спостерігати
- E** Накласти компрес

9. Ви фельдшер швидкої допомоги прибули на виклик. При огляді потерпілого з колотою раною грудної клітки виявлено, що в момент видиху повітря заходить зі свистом у плевральну порожнину, а при вдиху – краї рани злипаються. Яке ускладнення найбільш вірогідне в даному випадку?

- A** *Клапанний пневмоторакс
- B** Відкритий пневмоторакс
- C** Закритий пневмоторакс
- D** Стиснення грудної клітки
- E** Змішаний пневмоторакс

10. Чоловік Д., 48 років, отримав травму грудної клітки. Турбують болі у правій половині грудної клітки, задишка, утруднення дихання. Фельдшер швидкої допомоги діагностував перелом VI ребра. Як потрібно транспортувати потерпілого?

- A** *В напівсидячому положенні
- B** Лежачи на боці
- C** Лежачи на спині
- D** Лежачи на животі
- E** Сидячи

11. На вулиці під час проведення непрямого масажу серця ви відчули характерний хруст, що свідчить про перелом ребра. Ваші дії:

- A** *Продовжувати СЛР, правильно розташували руки на грудині
- B** Припинити реанімаційні міроприємства та застосувати прекардіальний удар
- C** Константувати біологічну смерть потерпілого
- D** Перейти до прямого масажу серця
- E** Продовжувати СЛР, змістивши руки до неушкоджених ребер

12. Перша допомога при відкритому пневмотораксі:

- A.** *Оклюзійна пов'язка
- B.** Тиснуча пов'язка

- C. УВЧ
- D. Спостереження
- E. УФО

13. Ви – фельдшер ФАПУ. Вас викликали до пацієнта, який отримав поранення грудної клітки. Скаржитесь на тупий біль у грудях, утруднене дихання. При обстеженні Ви виявили: аускультативно – різко ослаблене дихання, перкуторно – коробковий звук. Ваш діагноз?

- A. *Закритий пневмоторакс
- B. Гемоторакс
- C. Відкритий пневмоторакс
- D. Клапанний пневмоторакс
- E. набряк легень

14. Кормляча мати 22 років звернулась на ФАП зі скаргами на підвищену температуру тіла до 39°C, біль у грудній залозі, слабкість, головний біль. Об'єктивно: грудна залоза збільшена в об'ємі, шкіра гіперемована, пальпаторно – болюча, збільшені підпахвові лімфатичні вузли. Ваш діагноз:

- A. *Мастит лактаційний
- B. Рак молочної залози
- C. Мастопатія
- D. Фіброаденома
- E. Рак Педжета

15. До фельдшера ФАПу звернувся потерпілий зі скаргами на біль в ділянці грудної клітини праворуч. Травму отримав при падінні з драбини. Об'єктивно: набряк шкіри, біль і крепітація відламків на рівні VI-VIII ребер праворуч, задишка. Ваш попередній діагноз?

- A. Перелом ребер
- B. Закритий пневмоторакс
- C. Забій легені
- D. Перелом грудини
- E. Гемоторакс

16. У молодого чоловіка ножове поранення грудної клітки. Положення вимушене, у 5 міжребер'ї справа різана рана 3x1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. Яку пов'язку необхідно накласти на місці події?

- A. Оклюзійну
- B. Спіральну
- C. Хрестоподібну
- D. Циркулярну
- E. Колосоподібну

17. У хворого діагностували відкритий пневмоторакс. Що потрібно зробити в першу чергу для покращення його стану?

- A. Накласти оклюзійну пов'язку
- B. Накласти спіральну пов'язку
- C. Накласти пов'язку Дезо
- D. Ввести дихальні аналептики.
- E. Накласти хрестоподібну пов'язку

18. Жінка М., 24 років звернулась на ФАП зі скаргами на біль в лівій половині грудної клітки, який виник після травми. Біль посилюється при кашлі, рухах. Під час огляду в ділянці 4-5 ребер зліва відмічається гематома, набряк м'яких тканин та відставання грудної клітки в акті дихання. При пальпації в ділянці 4-5 ребер різка болючість, відчувається хруст. Визначте діагноз:

- A. Перелом 4-5 ребер
- B. Стиснення грудної клітки
- C. Перелом грудини

- D.** Перелом ключиці
- E.** Струс грудної клітки

19. У молодого чоловіка 20 років, ножове поранення грудної клітки. Положення вимушене, у п'ятому міжребер'ї справа - різана рана розміром 3x1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. Що необхідно фельдшеру виконати на місці події?

- A.** *Накласти оклюзійну пов'язку.
- B.** Накласти циркулярну пов'язку
- C.** Накласти колосоподібну пов'язку
- D.** Накласти хрестоподібну пов'язку
- E.** Накласти спіральну пов'язку.

20. Під час роботи будівельник впав з риштування і вдарився грудною кліткою в дошку, яка стирчала. Негайно викликали фельдшера здоровпункту. Потерпілий стогне. Наявна рана в проекції 4 ребра справа по аксілярній лінії, яку потерпілий прикриває рукою. Задишка. Запідозрено відкритий пневмоторакс. Які негайні дії фельдшера?

- A.** *Накласти оклюзійну пов'язку в напівсидячому положенні
- B.** Негайно налагодити інфузійну протишокову терапію
- C.** Провести знеболення і накласти асептичну пов'язку
- D.** Покласти потерпілого горизонтально і чекати ШМД
- E.** Зосередитись на збиранні скарг і анамнезу життя

21. До Вас на ФАП доставили потерпілого 24 років з ножовим пораненням грудної клітки. Ви виявили, що під час вдиху повітря виходить із рани, а під час видиху заходить у плевральну порожнину, чути "свист". Що необхідно зробити в першу чергу?

- A.** *Накласти оклюзійну пов'язку
- B.** Накласти транспортну іммобілізацію
- C.** Надати горизонтального положення
- D.** Ввести кровоспинні препарати
- E.** Покласти холод на поранену ділянку

22. Ви фельдшер швидкої медичної допомоги у постраждалого, 35 років, правосторонній відкритий пневмоторакс. Першочергові дії фельдшера.

- A.** *Накласти оклюзійну пов'язку на рану
- B.** Ввести антисептик
- C.** Госпіталізувати постраждалого
- D.** Накласти асептичну пов'язку на рану
- E.** Ввести знеболюючі