

Захворювання та ушкодження хребта, таза, кінцівок.

1. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас доставлений потерпілий. Під час зіткнення автомобілів пацієнт 31 року був затиснутий в машині. В свідомості. Скаржиться на сильний біль в ділянці тазу, відсутність виділення сечі. При огляді: в ділянці тазу деформація. В якому положенні слід транспортувати пацієнта в медичний заклад?

- A.** *В положенні "жаби "
- B.** Напівсидячи
- C.** Сидячи
- D.** Лежачи на спині
- E.** Лежачи на животі

2. Транспортування потерпілого з переломом хребта при відсутності щита проводиться в положенні:

- A** *На животі
- B** На лівому боці
- C** На правому боці
- D** На спині
- E** Сидячи

3. Фельдшер ШМД оглянув пацієнта, 30 р., який упав з висоти 2 метрів на ноги. Об'єктивно: болючість у ділянці другого поперекового хребця, яка збільшується при навантаженні по вісі хребта. Вкажіть положення, у якому необхідно транспортувати пацієнта:

- A** *На спині
- B** На лівому боці
- C** На правому боці
- D** Напівсидячи
- E** У положенні "жаби"

4. У хворого діагностовано перелом кісток тазу. Назвіть метод транспортування пацієнта?

- A** *У положенні "жаби"
- B** На щиті
- C** Сидячи в кріслі
- D** Лежачи на правому боці
- E** Лежачи на животі

5. Який метод транспортування хворого з підозрою на перелом хребта?

- A** *Лежачи на щиті
- B** Лежачи на правому боці
- C** В положенні "жаби"
- D** Лежачи на лівому боці
- E** Сидячи на кріслі

6. Ви фельдшер швидкої допомоги. Жінку М., 40-а років, збила машина. Скаржиться на болі внизу живота і неможливість рухати ногами. При пальпації відмічається різкий біль в проекції лобкового зрощення, лобкових кісток. Позитивний симптом "прилиплої п'яти". Ви ввели протишокові засоби. Яка транспортна іммобілізація є найбільш правильною?

- A.** *Укласти на тверді носі у положенні "жаби"
- B.** При допомозі шини Дітерікса
- C.** При допомозі шини Белера
- D.** Укласти на тверді носі на живіт
- E.** Укласти на носі та під шию покласти валик

7. У хворого 40 років є підозра на перелом у шийному відділі хребта внаслідок ДТП. На час прибуття фельдшера швидкої допомоги він знаходиться в салоні автомобілю. Які першочергові дії фельдшера по організації надання допомоги?

- A.** *Накласти шийний комір, обережно витягти з машини

- B.** Зробити спробу вправити вивих, а потім витягти з машини
- C.** Ввести антидепресанти (амілінітрат 2,0 мл в/м)
- D.** Як можна швидше витягти з машини та направити до лікарні
- E.** Ввести новокаїн 2% 2 мл у місце вірогідного пошкодження хребта паравертебрально

8. Об'ємом невідкладної допомоги при травмі хребта буде:

- A.** *Знеболювання, протишокова терапія, транспортування на щиті
- B.** Знеболювання, протишокова терапія, фіксація шиною Дітеріхса
- C.** Знеболювання, фіксація шиною Крамера, протишокова терапія
- D.** Протишокова терапія, транспортування на ношах, комірць Шанца
- E.** Знеболювання, транспортування в напівсидячому положенні

9. З місця аварії доставлено хворого із скаргами на біль в ділянці таза, який посилюється при рухах ногами. Хворий загальмований, на запитання відповідає односкладне. При пальпації болісність в проекції лонного сполучення. Спостерігається симптом “прилиплої п'яти”.

Визначитись з діагнозом.

- A.** *Перелом кісток таза
- B.** Перелом поперекового відділу хребта
- C.** Забій м'яких тканин
- D.** Перелом стегна
- E.** Вивих стегна

10. Пацієнту з відкритим переломом стегна в нижній третині, ускладненим артеріальною кровотечею, при наданні першої допомоги провели тимчасову зупинку кровотечі за допомогою джгута. Що буде наступним етапом у наданні невідкладної допомоги цьому пацієнту?

- A.** *Знеболювання
- B.** Холод на місце травми
- C.** Госпіталізація хворого у травматологічне відділення
- D.** Іммобілізація ушкодженої кінцівки
- E.** Накладання захисної асептичної пов'язки

11. Ви фельдшер швидкої допомоги. У потерпілого в ДТП діагностовано відкритий перелом плеча, ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги?

- A.** *Джгут, знеболити, пов'язка, шина
- B.** Джгут, шина, знеболити, пов'язка
- C.** Знеболити, пов'язка, джгут, шина
- D.** Пов'язка, знеболити, джгут, шина
- E.** Шина, знеболити, джгут, пов'язка

12. До здорвпункту принесли робітника К. 40 р., рука якого потрапила до транспортеру. Права верхня кінцівка відірвана до ліктьового суглобу. Свідомість збережена, але хворий загальмований. Стан дуже важкий. АТ- 80/30 мм рт.ст. Тони серця чисті, приглушені. Надати невідкладну допомогу.

- A.** *Покласти хворого, накласти джгут на плече, ввести знеболююче
- B.** Накласти на культю асептичну пов'язку, ввести знеболююче
- C.** Розпочати протишокову терапію
- D.** Накласти пов'язку на культю
- E.** Покласти хворого, розпочати протишокову терапію

13. Ви фельдшер ШМД, оглядаєте хворого з відкритим переломом кістки стегна та артеріальною кровотечею. Визначити першочерговий обсяг втручань при наданні невідкладної допомоги на догоспітальному етапі:

- A.** *Накласти джгут, знеболити, транспортувати
- B.** Знеболити, транспортувати до лікарні
- C.** Накласти джгут, транспортувати до лікарні
- D.** Ввести гемостатики, накласти асептичну пов'язку

E. Ввести антибіотики, накласти асептичну пов'язку

14. У хворого відкритий перелом плеча, ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги.

- A.** *Джгут, знеболення, пов'язка, шина
- B.** Шина, знеболення, джгут, пов'язка
- C.** Джгут, шина, знеболення, пов'язка
- D.** Знеболення, пов'язка, джгут, шина
- E.** Пов'язка, знеболення, джгут, шина

15. Ви працюєте фельдшером ФАПУ. До Вас доставлений потерпілий. Під час зіткнення автомобілів пацієнт 31 року був затиснутий в машині. В свідомості. Скаржиться на сильний біль в ділянці тазу, відсутність виділення сечі. При огляді: в ділянці тазу деформація. В якому положенні слід транспортувати пацієнта в медичний заклад?

- A.** *В положенні "жаби "
- B.** Напівсидячи
- C.** Сидячи
- D.** Лежачи на спині
- E.** Лежачи на животі

16. Транспортування потерпілого з переломом хребта при відсутності щита проводиться в положенні:

- A** *На животі
- B** На лівому боці
- C** На правому боці
- D** На спині
- E** Сидячи

17. Фельдшер ШІМД оглянув пацієнта, 30 р., який упав з висоти 2 метрів на ноги. Об'єктивно: болючість у ділянці другого поперекового хребця, яка збільшується при навантаженні по вісі хребта. Вкажіть положення, у якому необхідно транспортувати пацієнта:

- A** *На спині
- B** На лівому боці
- C** На правому боці
- D** Напівсидячи
- E** У положенні "жаби"

18. У хворого діагностовано перелом кісток тазу. Назвіть метод транспортування пацієнта?

- A** *У положенні "жаби"
- B** На щиті
- C** Сидячи в кріслі
- D** Лежачи на правому боці
- E** Лежачи на животі

19. Який метод транспортування хворого з підозрою на перелом хребта?

- A** *Лежачи на щиті
- B** Лежачи на правому боці
- C** В положенні "жаби"
- D** Лежачи на лівому боці
- E** Сидячи на кріслі

20. Ви фельдшер швидкої допомоги. Жінку М., 40-а років, збила машина. Скаржиться на болі внизу живота і неможливість рухати ногами. При пальпації відмічається різкий біль в проекції лобкового зрощення, лобкових кісток. Позитивний симптом "прилиплої п'яти". Ви ввели протишокові засоби. Яка транспортна іммобілізація є найбільш правильною?

- A.** *Укласти на тверді носі у положенні "жаби"

- B.** При допомозі шини Дітерікса
- C.** При допомозі шини Белера
- D.** Укласти на тверді ноші на живіт
- E.** Укласти на ноші та під шию покласти валик

21. У хворого 40 років є підозра на перелом у шийному відділі хребта внаслідок ДТП. На час прибуття фельдшера швидкої допомоги він знаходиться в салоні автомобілю. Які першочергові дії фельдшера по організації надання допомоги?

- A.** *Накласти шийний комір, обережно витягти з машини
- B.** Зробити спробу вправити вивих, а потім витягти з машини
- C.** Ввести антидепресанти (амілінітрат 2,0 мл в/м)
- D.** Як можна швидше витягти з машини та направити до лікарні
- E.** Ввести новокаїн 2% 2 мл у місце вірогідного пошкодження хребта паравертебрально

22. Об'ємом невідкладної допомоги при травмі хребта буде:

- A.** *Знеболювання, протишокова терапія, транспортування на щиті
- B.** Знеболювання, протишокова терапія, фіксація шиною Дітерікса
- C.** Знеболювання, фіксація шиною Крамера, протишокова терапія
- D.** Протишокова терапія, транспортування на ношах, комірці Шанца
- E.** Знеболювання, транспортування в напівсидячому положенні

23. З місця аварії доставлено хворого із скаргами на біль в ділянці таза, який посилюється при рухах ногами. Хворий загальмований, на запитання відповідає односкладне. При пальпації болісність в проекції лонного сполучення. Спостерігається симптом "прилиплої п'яти".

Визначитись з діагнозом.

- A.** *Перелом кісток таза
- B.** Перелом поперекового відділу хребта
- C.** Забій м'яких тканин
- D.** Перелом стегна
- E.** Вивих стегна

24. Пацієнту з відкритим переломом стегна в нижній третині, ускладненим артеріальною кровотечею, при наданні першої допомоги провели тимчасову зупинку кровотечі за допомогою джгута. Що буде наступним етапом у наданні невідкладної допомоги цьому пацієнту?

- A.** *Знеболювання
- B.** Холод на місце травми
- C.** Госпіталізація хворого у травматологічне відділення
- D.** Імобілізація ушкодженої кінцівки
- E.** Накладання захисної асептичної пов'язки

25. Ви фельдшер швидкої допомоги. У потерпілого в ДТП діагностовано відкритий перелом плеча, ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги?

- A.** *Джгут, знеболити, пов'язка, шина
- B.** Джгут, шина, знеболити, пов'язка
- C.** Знеболити, пов'язка, джгут, шина
- D.** Пов'язка, знеболити, джгут, шина
- E.** Шина, знеболити, джгут, пов'язка

26. До здорвпункту принесли робітника К. 40 р., рука якого потрапила до транспортеру. Права верхня кінцівка відірвана до ліктьового суглобу. Свідомість збережена, але хворий загальмований. Стан дуже важкий. АТ- 80/30 мм рт.ст. Тони серця чисті, приглушені. Надати невідкладну допомогу.

- A.** *Покласти хворого, накласти джгут на плече, ввести знеболююче
- B.** Накласти на культю асептичну пов'язку, ввести знеболююче
- C.** Розпочати протишокову терапію

- D.** Накласти пов'язку на культю
- E.** Покласти хворого, розпочати протишокову терапію

27. Ви фельдшер ШМД, оглядаєте хворого з відкритим переломом кістки стегна та артеріальною кровотечею. Визначити першочерговий обсяг втручань при наданні невідкладної допомоги на догоспітальному етапі:

- A.** *Накласти джгут, знеболити, транспортувати
- B.** Знеболити, транспортувати до лікарні
- C.** Накласти джгут, транспортувати до лікарні
- D.** Ввести гемостатики, накласти асептичну пов'язку
- E.** Ввести антибіотики, накласти асептичну пов'язку

28. У хворого відкритий перелом плеча, ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги.

- A.** *Джгут, знеболення, пов'язка, шина
- B.** Шина, знеболення, джгут, пов'язка
- C.** Джгут, шина, знеболення, пов'язка
- D.** Знеболення, пов'язка, джгут, шина
- E.** Пов'язка, знеболення, джгут, шина