

### **Невідкладні стани у внутрішній медицині**

**1** У хворого астматичний статус. Який препарат Ви використаєте на долікарському етапі?

- A** \*Преднізолон
- B** Дібазол
- C** Інсулін
- D** Пеніцилін
- E** Анальгін

**2** У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Що Ви використаєте при наданні невідкладної допомоги?

- A** \*Адреналін
- B** Анальгін
- C** Дібазол
- D** Но-шпу
- E** Дицинон

**3** Медсестра під час проведення шлункового зондування тонким зондом помітила у шлунковому вмісті значну кількість крові. Які її першочергові дії?

- A** \*Припинити зондування
- B** Продовжити зондування
- C** Зробити перерву
- D** Поставити грілку на живіт
- E** -

**4** У хворого критичне зниження температури тіла, з'явилися ознаки гострої судинної недостатності. Яке залежне сестринське втручання виконаєте при наданні допомоги?

- A** \*Ввести судинні засоби
- B** Покласти грілки до ніг
- C** Дати випити каву
- D** Підняти ніжний кінець ліжка
- E** Забрати подушку з-під голови

**5** У кардіологічне відділення терміново госпіталізований пацієнт з діагнозом: гострий інфаркт міокарда. Йому проводиться комплекс інтенсивної терапії та догляду. При плануванні заходів медсестринської допомоги пацієнту Вашим першочерговим завданням буде:

- A** \*Забезпечити повний фізичний та психічний спокій
- B** Забезпечити комплекс гігієнічних заходів догляду за шкірою
- C** Спостереження за пульсом, артеріальним тиском
- D** Годування пацієнта та догляду за порожниною рота
- E** Слідкувати за фізіологічними відправленнями

**6** На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 33 років з приводу бронхіальної астми. Яке медсестринське втручання необхідно здійснити у разі нападу бронхіальної астми?

- A** \*Заспокоїти пацієнта, застосувати інгаляційно сальбутамол
- B** Заспокоїти пацієнта, дати зволожений кисень
- C** Заспокоїти пацієнта, поставити міхур з льодом на грудну клітку

**D** Заспокоїти пацієнта, дати відхаркувальну мікстуру

**E** Заспокоїти пацієнта, провести лужну інгаляцію

**7** Пацієнту на цукровий діабет медсестра за призначенням лікаря ввела 24 одиниці інсуліну. Через 20 хв. він звернувся до неї зі скаргами на відчуття сильного голоду, тремтіння кінцівок і всього тіла. Шкіра бліда, вкрита холодним потом. Яку термінову допомогу потрібно надати пацієнту?

**A** \*Випити солодкого чаю

**B** Укласти в ліжку, зігріти

**C** Прийняти заспокійливі

**D** Прийняти цукрознижуючі

**E** -

**8** Пацієнт звернувся до сімейної медсестри зі скаргами на сильний біль голови у потилиці, шум у вухах. Такі напади спостерігаються після психічних навантажень. АТ коливається від 150/100 до 190-110 мм рт.ст. Розвиток якого синдрому спостерігається у хворого?

**A** \*Гіпертензивного

**B** Гострої серцевої недостатності

**C** Вінцевої недостатності

**D** Гіпотензивного

**E** Гострої судинної недостатності

**9** Сімейну медсестру викликали до хворого 48 років, який скаржиться на біль тиснучого характеру за грудиною, що віддає у ліву руку. Біль з'явився після підняття по сходах. Який засіб слід використати в першу чергу?

**A** \*Нітрогліцерин

**B** Ніфедипін

**C** Аспірин

**D** Атенотол

**E** Папаверин

**10** Пацієнта доставлено в приймальне відділення без свідомості. Впродовж 8 років хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. На роботі втратив свідомість. Об'єктивно: шкіра чиста, волога, гіпертонус м'язів. АТ- 115/70 мм рт.ст. Яке ускладнення основного захворювання виникло у пацієнта?

**A** \*Гіпоглікемічна кома

**B** Гіперосмолярна кома

**C** Молочнокисла кома

**D** Гіперглікемічна кома

**E** Церебральна кома

**11** В маніпуляційному кабінеті після введення антибіотика внутрішньом'язово у пацієнта з'явилися шум в вухах, почуття задухи, втрата свідомості. Яке ускладнення запідозрить медична сестра?

**A** \*Анафілактичний шок

**B** Непритомність

- C* Колапс
- D* Кардіогенний шок
- E* Токсико-інфекційний шок

**12** У хворого 65-ти років на рак легенів виникла легенева кровотеча. Який з перерахованих препаратів слід ввести?

- A* \*Амінокапронову кислоту
- B* Анальгін
- C* Адреналін
- D* Гемостимулін
- E* Вітамін В<sub>12</sub>

**13** Пацієнтка доставлена бригадою швидкої допомоги у терапевтичне відділення зі скаргами на блювання темно-коричневого кольору, дьогтеподібні випорожнення, біль у животі, серцебиття, загальну слабкість. Страждає на виразкову хворобу шлунка. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- A* \*Шлункова кровотеча
- B* Легенева кровотеча
- C* Гемороїдальна кровотеча
- D* Стравохідна кровотеча
- E* Маткова кровотеча

**14** Жінку укусила бджола в праве плече. Вона звернулася до медичної сестри зі скаргами на набряк, свербіння у місці укусу. Яку невідкладну допомогу треба надати хворій?

- A* \*Накласти міхур з льодом
- B* Накласти пов'язку з фурациліном
- C* Ввести р-н анальгін
- D* Обробити розчином йоду
- E* Прикласти грілку до місця укусу

**15** У хворої, яка страждає на гіпертиреоз, після психоемоційної травми з'явилися різке збудження, профузна пітливість, висока температура тіла (41 °С), тахікардія, АТ- 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у пацієнтки?

- A* \*Тиреотоксична криза
- B* Гіпертонічна криза
- C* Порушення мозкового кровообігу
- D* Напад серцевої астми
- E* Напад стенокардії

**16** У пацієнта на гіпертонічну хворобу ввечері раптово підвищився артеріальний тиск. З'явився біль в ділянці серця і потилиці, миготіння "мушок" перед очима, нудота. Об'єктивно: АТ- 260/100 мм рт.ст. Пульс - 120/хв., ритмічний. Обличчя гіперемійоване, шкіра волога. Яке ускладнення виникло?

- A* \*Гіпертонічна криза
- B* Стенокардія
- C* Гостре порушення мозкового кровообігу
- D* Інфаркт міокарду
- E* Гостра лівошлуночкова недостатність

**17** У пацієнтки на цукровий діабет з'явилась слабкість, зниження працездатності, погіршення апетиту, спрага, сонливість, шумне дихання Куссмауля, запах ацетону з рота. Через 2 доби втратила свідомість. АТ- 100/60 мм рт.ст. Пульс - 110/хв., ритмічний. Шкіра суха. Очні яблука м'які, зіниці звужені. Яке ускладнення виникло у хворой?

- A** \*Гіперглікемічна кома
- B** Гіперсмолярна кома
- C** Гіпоглікемічна кома
- D** Уремична кома
- E** Печінкова кома

**18** У пацієнта на гіпертонічну хворобу після стресу ввечері з'явилась різка слабкість, біль в ділянці серця з ірадіацією в ліве плече і руку впродовж 30 хвилин, не знімається нітрогліцерином. Об'єктивно: блідий, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 90/хв., аритмічний. Що запідозрить медична сестра?

- A** \*Інфаркт міокарду
- B** Шок
- C** Колапс
- D** Серцеву астму
- E** Стенокардію

**19** В гастроентерологічному відділенні у пацієнта на виразкову хворобу шлунка раптово вночі з'явився "кинжальний" біль у надчеревній ділянці. Об'єктивно: холодний липкий піт, блідість шкіри. Захисне напруження м'язів передньої черевної стінки, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- A** \*Перфорація
- B** Пенетрація
- C** Пілоростеноз
- D** Малігнізація
- E** Шлункова кровотеча

**20** Під час прогулянки в полі чоловіка вкусила оса. Невдовзі він поскаржився на біль в гортані, охриплість голосу, утруднене дихання, нудоту. Об'єктивно: набряк губ, язика, мигдаликів, повік. Дихання шумне. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A** \*Набряк Квінке
- B** Гострий риніт
- C** Анафілактичний шок
- D** Кропив'янка
- E** Астматичний статус

**21** Пацієнт 42 років звернувся до чергової медичної сестри онкологічного диспансеру з такими проблемами: кашель з виділенням яскраво-червоної крові, запаморочення. Який препарат підготує медсестра для надання допомоги?

- A** \*Дицинон
- B** Диклофенак
- C** Дипіридамо́л
- D** Димедрол
- E** Дилтіазем

**22** Пацієнт 53 років звернувся до дільничної медсестри зі скаргами на стискаючий біль за грудиною, який триває 4-5 хвилин та іррадіює в ліве плече, ліву руку. Який препарат застосовують з метою розширення коронарних артерій?

- A** \*Нітрогліцерин
- B** Нітроксолін
- C** Димедрол

- D** Омнопон
- E** Папаверин

**23** Пациент, 34 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом - язвенная болезнь желудка. Жалуется на слабость, головокружение, рвоту “кофейной гущей”, дегтеобразный кал. Какое осложнение возникло у пациента?

- A** \*Желудочно-кишечное кровотечение
- B** Перфорация язвы
- C** Пенетрация
- D** Малигнизация
- E** Стеноз привратника

**24** Медсестру пригласили к соседу, 54 года, страдает сахарным диабетом. Со слов родственников жаловался на слабость, чувство голода, дрожание тела, головокружение. Затем потерял сознание. Объективно: кожа бледная, влажная, тонус мышц повышен, дыхание поверхностное, глазные яблоки обычные, запаха ацетона нет. Какое состояние возникло у пациента?

- A** \*Гипогликемическая кома
- B** Гипергликемическая кома
- C** Уремическая кома
- D** Печеночная кома
- E** Анафилактический шок

**25** Больная К., 47 лет, находится на лечении с диагнозом - язвенная болезнь желудка. Внезапно возникла резкая “кинжальная” боль в эпигастральной области, слабость, головокружение. Тактика медсестры в данной ситуации:

- A** \*Вызвать врача
- B** Ввести анальгин
- C** Ввести спазмолитики
- D** Промыть желудок
- E** Дать теплое питье

**26** У пациента онкодиспансера спостерігається виділення під час кашлю червоної пінистої крові. Протягом останніх двох місяців погіршився апетит, з'явилася слабкість, знизилася маса тіла. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс - 100 уд/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. В аналізі мокротиння виявлені атипівні клітини. Яку долікарську допомогу необхідно надати пацієнту в першу чергу?

- A** \*Покласти міхур з льодом на грудну клітку
- B** Покласти теплу грілку на грудну клітку
- C** Поставити гірчичники на стегно
- D** Провести оксигенотерапію
- E** -

**27** У пацієнта після вживання меду з'явилися скарги на різке нездужання, утруднене дихання, осиплість голосу. Під час огляду: стан середньої тяжкості, свідомість збережена. шкірні покриви бліді, набрякли губи, повіки та язик. Пульс - 92 уд/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A** \*Набряк Квінке
- B** Кропив'янка
- C** Сироваткова хвороба
- D** Напад бронхіальної астми
- E** Анафілактичний шок

**28** У пацієнтки 54, яка хворіє на цукровий діабет, раптово появились загальна слабкість, відчуття голоду, тремтіння тіла, запаморочення, втрата свідомості. Який із препаратів медсестра повинна підготувати?

- A** \*40% розчин глюкози
- B** 0,9% розчин хлориду натрію
- C** Інсулін
- D** Кордіамін
- E** Строфантин

**29** Хвора скаржиться на інтенсивний тиснучий біль за грудиною, що триває 45 хв., слабкість, серцебиття, страх смерті. Об'єктивно: шкіра бліда, синюшність губ. Тони серця ослаблені, ритмічні. Пульс - 108/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Яке захворювання запідозрить медсестра?

- A** \*Гострий інфаркт міокарда
- B** набряк легень
- C** Стенокардія
- D** Міокардит
- E** Сухий плеврит

**30** У пацієнтки після введення протиправцевої сироватки через декілька хвилин з'явилась різка кволість, запаморочення, серцебиття, задишка. Пізніше втратила свідомість. Об'єктивно: виражена блідість шкіри та слизових, пітливість. Рс- 110/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст. Вкажіть причину погіршення стану пацієнтки:

- A** \*Анафілактичний шок
- B** Астматичний статус
- C** Травматичний шок
- D** Геморагічний шок

**31** Пацієнт доставлений в лікарню у тяжкому стані, свідомість сплутана. Шкіра суха, запах ацетону в повітрі. Пульс - 115/хв., ритмічний, АТ- 95/65 мм рт.ст. Дихання шумне, типу Кусмауля. До якого найбільш інформативного методу дослідження підготує медична сестра пацієнта?

- A** \*Визначення рівня глюкози в крові
- B** Визначення вазопресину в крові
- C** Визначення креатиніну крові
- D** Визначення рівня білірубину
- E** Визначення рівня рН крові

**32** У пацієнта на гострий інфаркт міокарда розвивається набряк легенів. Яка першочергова дія медсестри?

- A** \*Надати напівсидячого положення з опущеними ногами
- B** Надати положення з опущеною головою
- C** Надати горизонтального положення з піднятими ногами
- D** Надати сидячого положення
- E** Надати положення на боці

**33** Пацієнтка лікується з приводу цукрового діабету. Поскаржилася медсестрі на відчуття голоду, слабості, тремтіння рук. Якою буде першочергова дія медсестри?

**A** \*Дати солодкий чай або цукор

**B** Ввести розчин глюкози 5%

**C** Ввести розчин глюкози 20%

**D** Ввести інсулін короткої дії

**E** Ввести інсулін пролонгованої дії

**34** Дівчина 19 років після тривалого знаходження в душному приміщенні раптово знепритомніла. Об'єктивно: блідість шкіри, Рс- 90/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст. Вкажіть незалежне медсестринське втручання:

**A** \*Надати положення з припіднятими ногами

**B** Ввести еуфілін

**C** Ввести адреналін

**D** Ввести кальцію хлорид

**E** Надати хворій положення сидячи

**35** Хворий 54 років скаржиться на головний біль, запаморочення, слино- та слезотечу, нудоту, блювання, біль в животі. В день, коли захворів, розфасовував мішки з хлорофосом. Об'єктивно: шкіра волога. Зіниці звужені. Рс- 50/хв. Посіпування м'язів язика та обличчя. Який патологічний стан виник у пацієнта?

**A** \*Гостре отруєння хлорофосом

**B** Гостре отруєння свинцем

**C** Гостре отруєння ртуттю

**D** Гостре отруєння гранозаном

**E** Гостре отруєння миш'яком

**36** У пацієнта 53 років, який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні з діагнозом: "Абсцес правої легені", після виділення гнійного смердючого харкотиння "повним ротом" виник кашель з виділенням яскраво-червоної пінистої крові. Які першочергові дії медсестри?

**A** \*Викликати лікаря

**B** Ввести анальгін

**C** Ввести еуфілін

**D** Ввести дицинон

**E** Ввести кальцію глюконату

**37** У пацієнта Д., 48 років, який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з діагнозом: "Гострий інфаркт міокарда", раптово вночі виник напад інспіраторної задишки з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Яке медсестринське втручання виконає медсестра при наданні невідкладної допомоги?

**A** \*Інгаляцію кисню, насиченого 96% етиловим спиртом

**B** Дати хворому нітрогліцерин під язик

**C** Налогодити інгаляцію кисню, зволоженого водою

**D** Надати пацієнту напівсидячого положення

**38** Медична сестра, оцінюючи стан пацієнта, який лікується в терапевтичному відділенні з діагнозом: “цироз печінки”, звернула увагу, що він став млявим, сонливим. Хворий поскаржився на зниження апетиту, нудоту, біль у животі, підвищення температури тіла. Що необхідно виконати медичній сестрі в першу чергу?

**A** \*Негайно повідомити лікаря

**B** Взяти кров з вени на біохімічне дослідження

**C** Визначити добовий діурез

**D** Провести штучне годування хворого

**E** Ввести розчин глюкози внутрішньовенно крапельно