

Захворювання шлунково-кишкового тракту

1. В приймальне відділення швидкою допомогою доставлена хвора 42 років зі скаргами на біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, слинотечу, головний біль, різку загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що вона 2 години тому вживала недоброякісну їжу. Визначте першочергове медсестринське втручання:

- A. *Промієте шлунок
- B. Введете спазмолітики
- C. Дасте випити шлунковий сік
- D. Заспокоїте пацієнтку, дасте теплу грілку
- E. Дасте випити розчину содової води

2. При обстеженні пацієнта 48 років медична сестра виявила скарги на відсутність апетиту, відразу до м'ясної їжі та рибних страв, відчуття важкості в епігастрії, нудоту, втрату маси тіла. При пальпації живота відмічається болісність в епігастральній ділянці, пальпується пухлиноподібне утворення. Яке захворювання запідозрить медсестра?

- A. *Рак шлунку
- B. Хронічний гастрит
- C. Виразкова хвороба шлунку
- D. Хронічний ентероколіт
- E. Холецистопанкреатит

3. На стаціонарне лікування поступила пацієнтка зі скаргами на інтенсивний біль у правому підребер'ї з іррадіацією в праву лопатку, ключицю, плече, нудоту та блювання, здуття живота, підвищену температуру, остуду. Яка з проблем є пріоритетною?

- A. *Біль у правому підребер'ї
- B. Нудота, блювання
- C. Метеоризм
- D. Гіркота та сухість у роті
- E. Гарячка

4. Хворий С., 71 р., поступив на лікування в терапевтичне відділення. Скаржився на часті носові кровотечі, свербіж шкіри,

кровоточивість, судинні зірочки на шкірі. Про яку патологію можна подумати?

- A. *Цироз печінки
- B. Виразкова хвороба
- C. Холецистит
- D. Вірусний гепатит
- E. Ентероколіт

5.Пацієнт А., 37 років, потрапив у відділення зі скаргами на нудоту, блювання, біль в епігастрії, відрижку, пронос. Даний стан пов'язує з вживанням недоброякісної їжі. Встановлено діагноз: "Гострий гастрит". Які першочергові дії медсестри?

- A. *Промити шлунок
- B. Призначити дієту
- C. Призначити ліжковий режим
- D. Ввести спазмолітині ліки
- E. Призначити проти блювотні ліки

6.Пацієнтка В.,52 р., хворіє на жовчно-кам'яну хворобу, у якої після порушення дієти виникла інтенсивний біль у правому підребер'ї. Які засоби долікарської допомоги допоможуть зменшити біль?

- A. *Грілка на ділянку правого підребер'я
- B. Міхур з льодом на праве підребер'я
- C. Гірчичник на грудну клітку
- D. Банки на грудну клітку
- E. Ножні ванни

7.Хвора, 25 років, скаржиться на нудоту, відрижку повітрям, відчуття тяжкості в епігастрії, проноси. Під час огляду: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий в епігастральній ділянці. Яке дослідження є найбільш інформативним?

- A. *рН-метрія
- B. Дуоденальне зондування
- C. Копрологічне дослідження
- D. Загальний аналіз крові
- E. Загальний аналіз сечі

8. Хвора, 39 років, скаржиться на гострий, “кинджальний” біль у животі, різку загальну слабкість. Захворіла раптово після фізичного навантаження. В анамнезі – виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

- A. *Перфорація
- B. Шлункова кровотеча
- C. Пенетрація
- D. Малігнізація
- E. Пілоростеноз

9. Чоловік, 35 років, скаржиться на нудоту, блювання, біль оперізуючого характеру, слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та гострої, жирної їжі. Під час огляду: шкіра бліда, язик обкладений сірим нальотом, живіт болючий в епігастрії більше зліва. Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?

- A. *Аналіз сечі та крові на діастазу
- B. Загальний аналіз сечі
- C. Аналіз крові на цукор
- D. Копрологічне дослідження
- E. Аналіз калу на приховану кров

10. Який препарат призначають хворим на хронічний панкреатит з метою замісної терапії?

- A. *Фестал
- B. Атропін
- C. Алахол
- D. Но-шпу
- E. Папаверин

11. Ви берете участь в обстеженні пацієнта на хронічний панкреатит. Вкажіть, до якого обстеження його треба підготувати?

- A. *Аналізу сечі на діастазу
- B. Фіброгастроскопії
- C. Дуоденального зондування
- D. Холецистографії
- E. Колоноскопії

12. Пацієнт 42 років госпіталізований в гастроентерологічне відділення з діагнозом хронічний гастрит типу В. Вкажіть препарат, який застосовують для зниження секреції соляної кислоти.

- A. *Ранітидин
- B. Раунатин
- C. Регідрон
- D. Реланіум
- E. Ретаболіл

13. Пацієнт госпіталізований з підозрою на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки. До якого додаткового методу обстеження необхідно медичній сестрі підготувати пацієнта?

- A. *Гастродуоденоскопія
- B. Ректороманоскопія
- C. Колоноскопія
- D. Іригоскопія
- E. УЗД органів черевної порожнини

19. Найбільш інформативним методом діагностики хронічного гастриту є:

- A. *Фіброгастродуоденоскопія
- B. Рентгенологічне дослідження шлунка
- C. Ультразвукове обстеження органів травлення
- D. Копрологічне дослідження

20. Пацієнт з підозрою на хронічний гастрит знаходиться на обстеженні. Назвіть сучасний метод визначення секреторної функції шлунка:

- A. *Інтрагастральна Ph - метрія
- B. Дуоденальне зондування
- C. Фіброгастродуоденоскопія
- D. Копрологічне дослідження

21. Який метод обстеження дозволяє виявити у хворого на виразкову хворобу хелікобактерну інфекцію?

- A. *Дихальний тест
- B. Ph - метрія
- C. Томографія

- D. Фракційне дослідження секреції шлунка
- E. Копрологічне дослідження

22.Пацієнтка перебуває на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з приводу виразкової хвороби. Лікар призначив дослідження калу на приховану кров. Які харчові продукти необхідно виключити з раціону пацієнта з метою підготовки до дослідження?

- A. * М'ясо
- B. Солодощі
- C. Молоко
- D. Каші
- E. Чорний хліб

23.Пацієнт скаржиться на відсутність апетиту, переважно до м'ясної їжі, відчуття тяжкості в надчревній ділянці, нудоту, втрату маси тіла на 5 кг. Об'єктивно: блідість шкіри, пальпація надчревної ділянки болісна. У калі позитивна реакція на приховану кров. До якого дослідження м/с повинна підготувати пацієнта?

- A. *Гастрофіброскопія з прицільною біопсією
- B. Дослідження промивних вод шлунка
- C. Рентгенологічне дослідження шлунка
- D. УЗД органів черевної порожнини
- E. Комп'ютерна томографія шлунка

24.Медична сестра, навчаючи пацієнта методиці тюбажу (сліпого зондування), рекомендує вживати натще один із жовчогінних засобів:

- A. *Мінеральну воду без газу.
- B. Відвар ромашки.
- C. Розчин кальцію хлориду.
- D. Розчин гідрокарбонату натрію.
- E. Відвар подорожника.

25.Хворий знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні з діагнозом: "Гострий гастрит". Яку з перерахованих проблем пацієнта можна вважати пріоритетною?

- A. *Біль в епігастральній ділянці
- B. Неприємний присмак у роті

- C. Загальна слабкість
- D. Біль голови
- E. Відсутність апетиту

26. Хворий знаходиться на лікуванні у гастроентерологічному відділенні з діагнозом “Хронічний холецистит”. Яку з перерахованих проблем пацієнта можна вважати пріоритетною?

- A. *Ниючий біль в правому підребер’ї
- B. Дратівливість
- C. Відрижка повітрям
- D. Закрепи

27. Пацієнтка страждає хронічним гепатитом. Лікар призначив медикаментозне лікування. Які із призначених препаратів відносяться до гепатопротекторів?

- A. *Карсіл, силібор
- B. Тималін, тимоген
- C. Преднізолон, дексаметазон
- D. Рибоксин, кокарбоксілаза
- E. Рифампіцин, метранідазол

28. У пацієнта на цироз печінки розвинувся асцит. До якого втручання повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- A. *Абдомінальна пункція
- B. Стернальна пункція
- C. Плевральна пункція
- D. Люмбальна пункція

29. Хворий 40 років скаржиться на нудоту, блювання, печію, відчуття важкості в епігастральній ділянці. Ознаками якого синдрому є вказані проблеми?

- A. *Шлункової диспепсії
- B. Кишкової диспепсії
- C. Астено-вегетативний синдром
- D. Інтоксикаційний синдром
- E. Больовий синдром

30. У пацієнта підозра на жовчнокам’яну хворобу. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

- A. *УЗД
- B. Фіброгастродуоденоскопія
- C. Колоноскопія
- D. рН –метрія
- E. Іригоскопія

31. У пацієнта на рак шлунку в термінальній стадії скарги: біль у надчеревній ділянці, втрата апетиту, схуднення, загальна слабкість. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнта?

- A. *Шлункова кровотеча
- B. Голодний біль
- C. Блювання, яке приносить полегшення
- D. Тенезми
- E. Оперізуючий біль у животі

32. Пацієнт скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, відчуття гіркоти в роті, схуднення. При огляді: “судинні” зірочки на грудях, печінкові долоні, “голова медузи” на передній стінці живота, асцит. Який патологічний стан імовірний у пацієнта?

- A. *Цироз печінки
- B. Хронічний гастрит
- C. Виразкова хвороба шлунка
- D. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- E. Рак шлунка

33. Хворий скаржиться на тупий біль у надчеревній ділянці відразу після їди, бурчання та метеоризм, проноси. Який засіб використає медсестра за призначенням лікаря для усунення метеоризму?

- A. *Активоване вугілля
- B. Но-шпу
- C. Папаверин
- D. Алохол
- E. Левоміцетин

34. Хворий скаржиться на неприємний присмак у ротовій порожнині, печію, нудоту, блювання, біль у надчеревній ділянці. Напередодні споживав недоброякісну їжу. Об'єктивно: язик обкладений сіро-білим нальотом. При пальпації – помірна розлита болючість у надчеревній ділянці. Що запідозрить медична сестра?

- A. *Гострий гастрит
- B. Хронічний гастрит
- C. Печінкова коліка
- D. Виразкова хвороба шлунка
- E. Гострий панкреатит

35. До дільничного лікаря звернувся пацієнт. У нього виявлені такі проблеми: загальна слабкість, стомлюваність, зниження працездатності, зменшення апетиту, відраза до м'яса, відчуття тяжкості в надчеревній ділянці, втрата ваги 5 кг за місяць. При обстеженні: блідість та сухість шкіри. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- A. *Раку шлунка
- B. Виразкової хвороби шлунка
- C. Хронічного гепатиту
- D. Цирозу печінки
- E. Хронічного гастриту

36. Пацієнтці 40 років, яка знаходиться у гастроентерологічному відділенні з підозрою на хронічний холецистит, призначено дослідження жовчного міхура. До якого медичного обстеження медсестра підготує пацієнтку?

- A. *дуоденального зондування
- B. цистоскопії
- C. колоноскопії
- D. ФГДС
- E. іригоскопії

37. Медсестра складає план догляду за пацієнтом на виразкову хворобу шлунка у період загострення. Які незалежні медсестринські втручання потрібно включати до плану?

- A. *Провести бесіду про дотримання дієти
- B. Промити шлунок
- C. Застосувати анальгетики
- D. Провести шлункове зондування

38. У відділення поступив пацієнт з підозрою на малігнізацію виразки шлунку. Які проблеми виявить медсестра при обстеженні?

- A. *Зниження апетиту, відраза до м'яса

- В. Підвищення АТ, збільшення ЧДР
- С. Лихоманку, біль в попереку
- Д. Нудоту, зміну кольору сечі
- Е. Виразки на слизовій оболонці рота

39. У хворого Н., 27 р. з'явилися болі в епігастрії, що виникають через 1,5-2 год після прийому їжі, голодні, нічні болі, нудота. Яке захворювання можна запідозрити?

- А. *Виразкову хворобу 12 - палої кишки
- В. Виразкову хворобу шлунка
- С. Рак шлунка
- Д. Панкреатит
- Е. Холецистит

40. Хворий 52 років, скаржиться на слабкість, зниження апетиту, свербіж шкіри, біль у правому підребр'ї. В анамнезі вірусний гепатит С. Об'єктивно: іктеричність шкіри та слизових оболонок, телеангіоектазії, живіт збільшений за рахунок асцити, печінка на 5см нижче реберної дуги, край її гострий, болючий. Про яке захворювання можна подумати?

- А. *Цироз печінки
- В. Хронічний гепатит
- С. Жовчнокам'яну хворобу
- Д. Панкреатит
- Е. Рак печінки

41. Хворому з загостренням хронічного панкреатиту сестра медична повинна зібрати сечу:

- А. *На діастазу
- В. На загальноклінічний аналіз сечі
- С. За Нечипоренком
- Д. На бактеріологічне дослідження
- Е. За Зимницьким

42. На лікуванні в терапевтичному відділенні знаходиться пацієнт зі скаргами на біль в гастродуоденальній ділянці через 2-3 год. після прийому їжі, періодичний "голодний" нічний біль. Який з препаратів застосовується для лікування пацієнта з даною патологією?

- A. *Омепразол
- B. Панангін
- C. Дігосин
- D. Анальгін
- E. Фестал

43. В гастроентерологічному відділенні на лікуванні перебуває пацієнт з діагнозом хронічний холецистит. Лікар призначив пацієнтові жовчогінний препарат. Який препарат повинна приготувати медична сестра згідно листка призначення?

- A. *Холахол
- B. Анальгін
- C. Ампіцилін
- D. Баралгін
- E. Дігосин

44. У Пацієнта 42, жовчо – кам'яна хвороба, яка проявилася печінковою колькою. До якого інструментального методу дослідження згідно з листком призначення має підготувати медична сестра пацієнта:

- A. *УЗД
- B. Гастроскопії
- C. Іригоскопії
- D. Колоноскопії
- E. Рентгенографії шлунка

45. Пацієнтка 45 років скаржиться на періодичний ниючий біль у надчревіній ділянці, який з'являється через 40-60 хв після їди. Який медсестринський діагноз?

- A. *Ранній біль
- B. Пекучий біль
- C. Метеоризм
- D. Голодний біль
- E. Біль навколо пупка

46. Медична сестра має провести бесіду серед пацієнтів гастроентерологічного відділення на тему: „Профілактика хронічних гастритів”. На яке питання їй слід звернути особливу увагу?

- A. *Дотримання режиму і вимог раціонального харчування

- В. Споживання їжі, багаті на жири, вуглеводи
- С. Споживання їжі, багаті на клітковину
- Д. Надання переваги молочно-рослинній дієті

47. У пацієнта виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Який основний медсестринський діагноз:

- А. *Голодний біль
- В. Ранній біль
- С. Біль довкола пупка
- Д. "Кинджальний" біль
- Е. Колькоподібний біль

48. Пацієнт звернувся зі скаргами на біль в епігастральній ділянці. Із анамнезу відомо, що чотири години тому з'їв сумнівної якості м'ясо. Діагностовано гострий гастрит. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра при реалізації четвертого етапу медсестринського процесу?

- А. *Промити шлунок
- В. Заспокоїти пацієнта
- С. Ввести знеболювальні препарати
- Д. Ввести адсорбуючі препарати
- Е. Ввести антибіотики

49. У пацієнта діагностовано хронічний панкреатит в стадії загострення. Лікар призначив повний голод. Скільки часу медична сестра має контролювати дотримання пацієнтом даної вимоги?

- А. *2-3 дні
- В. 6 год
- С. 12 год
- Д. 24 год
- Е. 5-6 днів

50. Яка дієта призначається хворому при хронічному панкреатиті?

- А. *№ 5П
- В. № 9
- С. № 1
- Д. № 7
- Е. № 10

51. Основні клінічні синдроми виразкової хвороби дванадцятипалої кишки:

- A. *астеновегетативний, больовий, диспептичний
- B. гіпертензивний, інтоксикаційний, больовий
- C. набряковий, дизуричний, сечовий
- D. інтоксикаційний, набряковий, анемічний
- E. гіпертермічний, больовий, інтоксикаційний

52. Медсестра під час проведення шлункового зондування тонким зондом помітила у шлунковому вмісті значну кількість крові. Які її першочергові дії?

- A. *Припинити зондування
- B. Продовжити зондування
- C. Зробити перерву
- D. Поставити грілку на живіт

53. Пацієнтка доставлена бригадою швидкої допомоги у терапевтичне відділення зі скаргами на блювання темно-коричневого кольору, дьогтеподібні випорожнення, біль у животі, серцебиття, загальну слабкість. Страждає на виразкову хворобу шлунка. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- A. *Шлункова кровотеча
- B. Легенева кровотеча
- C. Гемороїдальна кровотеча
- D. Стравохідна кровотеча
- E. Маткова кровотеча

54. В гастроентерологічному відділенні у пацієнта на виразкову хворобу шлунка раптово вночі з'явився "кинджальний" біль у надчеревній ділянці. Об'єктивно: холодний липкий піт, блідість шкіри. Захисне напруження м'язів передньої черевної стінки, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- A. *Перфорація
- B. Пенетрація
- C. Пілоростеноз
- D. Малігнізація
- E. Шлункова кровотеча