

Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів черевної порожнини

1. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт із скаргами на біль у животі, загальну слабкість. З анамнезу стало відомо, що три години тому під час бійки отримав удар ногою в ділянку живота. Об'єктивно спостерігається: загальний стан погіршується, шкіра бліда, живіт м'який, локальний біль та напруження м'язів у ділянці удару. Ушкоджена частина живота відстає в акті дихання. Які найперші дії слід виконати медичній сестрі?

- *А. Холод на живіт, негайна госпіталізація
- В. Застосування анальгетиків
- С. Амбулаторне спостереження
- Д. Застосування спазмолітиків
- Е. Грілка на живіт, негайна госпіталізація

2. Сімейна медсестра оглядає пацієнта зі скаргами на біль у животі. Під час пальпації живота спостерігається посилення болю, якщо раптово прибрати руку. Як називається цей симптом?

- *А. Щоткіна-Блюмберга
- В. Сітковського
- С. Ровзінга
- Д. Ортнера
- Е. Пастернацького

3. Сімейна медсестра оглядає пацієнта зі скаргами на біль у животі. Під час пальпації живота спостерігається посилення болю, якщо раптово прибрати руку. Як називається цей симптом?

- *А. Щоткіна-Блюмберга
- В. Сітковського
- С. Ровзінга
- Д. Ортнера
- Е. Пастернацького

4. Пацієнт 26 років скаржиться на біль в епігастральній ділянці і його переміщення в праву клубову ділянку, диспепсичні розлади, гіпертермію. Об'єктивно спостерігається: пацієнт блідий, позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга та Ровзінга. Для якої патології характерні такі симптоми?

- *А. Гострий апендицит
- В. Пахвинна грижа
- С. Гострий панкреатит
- Д. Вірусний гепатит В
- Е. Гострий холецистит

5. До приймального відділення бригадою ЕМД доставлено пацієнта зі скаргами на біль у правому підреб'ї, який іррадіює в праве плече та в праву лопатку. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, склери жовті, біль у точці Кера, позитивний синдром Курвуазьє. Яке захворювання можна припустити?

- *А. Гострий холецистит
- В. Правосторонній пієлонефрит
- С. Перитоніт
- Д. Гострий панкреатит
- Е. Хронічний апендицит

6. У пацієнта 30 років, який має в анамнезі виразкову хворобу шлунка, раптово погіршився загальний стан. З'явилися різка слабкість, нудота, блювання. Блювотні маси кольору «кавової гущі». Яке ускладнення виразкової хвороби виникло в пацієнта?

- *А. Шлункова кровотеча
- В. Перфорація виразки
- С. Малігнізація виразки
- Д. Пенетрація виразки
- Е. Пілоростеноз

7. Під час рентгенологічного дослідження органів черевної порожнини на знімку виявлені чаші Клойбера. Яке захворювання можна припустити в цьому разі?

- *А. Кишкову непрохідність
- В. Гострий панкреатит
- С. Гострий холецистит
- Д. Піддіафрагмальний абсцес
- Е. Міжпелетельний абсцес

8. Пацієнт 48 років скаржиться на погіршення апетиту, схуднення, слабкість, біль в епігастрії постійного характеру незалежно від приймання їжі, відразу до м'ясної їжі, блювання. З анамнезу відомо, що пацієнт хворів на виразкову хворобу шлунка. Розвиток якого ускладнення в пацієнта можна припустити?

- *А. Малігнізація виразки
- В. Перфорація виразки
- С. Пілоростеноз
- Д. Шлункова кровотеча
- Е. Пенетрація виразки

9. Ви - сімейна медсестра, приймаєте пацієнта. При обстеженні живота відзначається посилення болю при раптовому віднятті руки від живота. Виберіть, який цей симптом:

- А. * Щоткіна-Блумберга
- В. Ортнера
- С. Ситковського
- Д. Пастернацького
- Е. Ровзінга

10. У приймальне відділення доставлений хворий, який лежить на правому боці з приведеними до живота ногами. З розмови з супроводжуючими виявлено, що чоловік на вулиці випадково відчув різкий біль у животі, впав. Перехожими доставлений у лікарню. Стан важкий. Хворий блідий. Живіт ''дошкоподібний''. Вкажіть Ваші дії:

- А. * Покласти холод на живіт, викликати хірурга
- В. Ввести знеболювальні, направити хворого на рентгенографію
- С. Покласти тепло на живіт, ввести знеболювальні
- Д. Покласти тепло на живіт, викликати хірурга
- Е. Ввести спазмолітики, викликати хірурга

11. Пацієнт 16-ти років отримав травму при падінні з висоти. Скаржиться на біль у черевній порожнині, більше зліва, слабкість, нудоту, Рз- 102/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. При обстеженні виявлено позитивний симптом Іванця-Киванця. Яка тактика медичної сестри при цьому стані?

- А. * Терміново доставити хворого до лікарні

- В.** Ввести наркотики
- С.** Покласти грілку на живіт
- Д.** Ввести знеболювальні засоби
- Е.** Ввести спазмолітики

12. Хворому який надійшов в приймальне відділення зробили рентгенологічне дослідження. Про яке захворювання свідчить наявність чаш Клойбера на оглядовій рентгенограмі?

- А.** * Гостра кишкова непрохідність
- В.** Гострий панкреатит
- С.** Гострий холецистит
- Д.** Гострий апендицит
- Е.** Перфоративна виразка шлунка

13. Чоловік 45-ти років під час бійки отримав сильний удар важким предметом в живіт. В результаті травми відбувся розрив кишечника. Яке ускладнення розвинеться у потерпілого?

- А.** * Перитоніт
- В.** Геморагічний шок
- С.** Хронічна кишкова непрохідність
- Д.** Гостра кишкова непрохідність
- Е.** Гемотрансфузійний шок

14. У разі якого ускладнення виразкової хвороби шлунка випорожнення мають дьогтеподібний вигляд?

- *А.** Кровотечі
- В.** Стенозі
- С.** Пенетрації
- Д.** Малігнізації
- Е.** Перфорації

15. У жінки, яка хворіє на цироз печінки, розвинулося варикозне розширення вен стравоходу та ускладнилося кровотечею. Що використовується в разі кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу?

- *А.** Зонд Блекмора
- В.** Шлунковий зонд
- С.** Інтубаційна трубка
- Д.** Назогастральний зонд
- Е.** Назоінтестинальний зонд

16. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт із скаргами на біль у животі, загальну слабкість. З анамнезу стало відомо, що три години тому під час бійки отримав удар ногою в ділянку живота. Об'єктивно спостерігається: загальний стан погіршується, шкіра бліда, живіт м'який, локальний біль та напруження м'язів у ділянці удару. Ушкоджена частина живота відстає в акті дихання. Які найперші дії слід виконати медичній сестрі?

- *А.** Холод на живіт, негайна госпіталізація
- В.** Застосування анальгетиків
- С.** Амбулаторне спостереження
- Д.** Застосування спазмолітиків
- Е.** Грілка на живіт, негайна госпіталізація.

17.Сімейна медсестра оглядає пацієнта зі скаргами на біль у животі. Під час пальпації живота спостерігається посилення болю, якщо раптово прибрати руку. Як називається цей симптом?

- *А. Щоткіна-Блюмберга
- В. Сітковського
- С. Ровзінга
- Д. Ортнера
- Е. Пастернацького