

## Термічні ушкодження. Електротравма. Догляд за хворими

1. Медичній сестрі потрібно надати медичну допомогу чоловіку з електро- травмою. Чоловік без свідомості, тримається за електричний дріт. З чого саме слід розпочати надання допомоги чоловіку?

- \*A. Звільнити потерпілого від джерела електроструму
- B. Дати вдихнути пари нашатирного спирту
- C. Провести ШВЛ
- D. Провести непрямий масаж серця
- E. –

2. У комбустіологічному відділенні перебуває пацієнт з опіками передньої поверхні обох стегон та тулуба, а також промежини. Визначте площу опіку:

- \*A. 28%
- B. 18%
- C. 27%
- D. 25%
- E. 36%

3. Під час пожежі чоловік отримав опік правої кисті. Медична сестра, обстежуючи місце пошкодження, діагностувала опік IV ступеня. Яка характерна ознака свідчить про це?

- \*A. Обвуглення м'яких тканин та кісток
- B. Некроз усієї товщі шкіри
- C. Некроз сосочкового шару шкіри
- D. Поява міхурів із геморагічним вмістом
- E. Поява міхурів із жовтуватим вмістом

4. 5-річний хлопчик випадково ковтнув з пляшечки рідину, на якій було зазначено «аміак». Яким антидотом скористується медсестра при наданні першої допомоги дитині до приїзду швидкої медичної допомоги при отруєнні лугами?

- A. \* Розчином лимонної кислоти
- B. Перевареною водою
- C. Дистильованою водою
- D. 5°о розчином глюкози
- E. Содовим розчином

5. Ви - медична сестра комбустіологічного відділення, де перебуває пацієнт з опіками передньої поверхні обох стегон та тулуба, а також промежини. Визначте % площі опіку:

- A. \* 28
- B. 36
- C. 27
- D. 18
- E. 25

6. Якого співвідношення вдихів та компресій під час проведення СЛР у дорослих необхідно дотримуватись як однією, так і двома особами згідно з рекомендаціями 2010 року Європейської Ради реанімації?

- A.** \* 2:30
- B.** 2:15
- C.** 1:15
- D.** 1:30
- E.** 2:10

7. У потерпілого площа опіків II-III ступенів складає 20%, розвивається опіковий шок. Вкажіть заходи протишокової терапії:

- A.** \* Знеболювання, корекція ОЦК
- B.** ШВЛ, непрямий масаж серця
- C.** Знеболювання, гемотрансфузія
- D.** Первинна обробка опіку, асептична пов'язка
- E.** ПХО рани, іммобілізація опікової ділянки