

Медсестринство в офтальмології

1. До очного центру звернувся пацієнт з травмою лівого ока. Лікар встановив діагноз -проникаюче поранення лівого ока. Яку пов'язку накладе медична сестра?

- A *Асептичну біокулярну
- B Асептичну монокулярну
- C Колову
- D Монокулярну лейкопластирну
- E Косинкову

2. Медичній сестрі очного відділення хворий скаржиться на біль та відчуття стороннього тіла у оці, спостерігається закидання очей. Яку хворобу можливо запідозрити?

- A *Кон'юктивіт
- B Кератит
- C Блефарит
- D Ірит
- E Катаракту

3. Чоловік звернувся до лікувального закладу зі скаргами на болючу припухлість верхньої повіки лівого ока. Об-но: на обмежаній ділянці краю верхньої повіки, припухлість, яка має жовтуватий колір, на вершині пустула, по периферії гіперемія, набряк. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A *Ячмінь
- B Халязіон
- C Абсцес
- D Флегмона
- E Алергічний набряк

4. Визначення меж поля зору проводять за допомогою:

- A *Периметра
- B Тонометра Маклакова
- C Офтальмоскопа
- D Таблиці Головіна-Сівцева
- E Щілинної лампи

5. В офтальмологічне відділення поступає пацієнт з ознаками гострого приступу глаукоми. Медсестра повинна виконати наступні лікарські призначення

- A *Закапувати 1% пілокарпін кожні 15 хвилин впродовж години
- B Закапати 1% атропін, 0,25% скополамін, 1% гоматропін
- C Закапати 30% сульфацил натрію, 0,25% левоміцетин
- D Закласти за повіку тетрациклінову або левоміцетинову мазь
- E Закапати дексаметазон, дексазон або гідрокортизон

6. На прийомі в офтальмолога пацієнт з ознаками лусочкового блефариту. Реалізуючи IV етап медсестринського процесу медсестра повинна

- A *Обробити краї повік діамантовим зеленим
- B Обробити краї повік розчином дімедролу
- C Обробити краї повік розчином анальгіну
- D Обробити краї повік розчином дексаметазону
- E Обробити краї повік розчином атропіну

7. На прийомі в офтальмолога пацієнт з діагнозом зріла катаракта. При цьому медсестра встановлює наступний медсестринський діагноз

- A *Зниження гостроти зору
- B Випадіння з поля зору
- C Гнійні виділення з ока
- D Біль ока, голови
- E Звуження поля зору

8. Хворий знаходиться на диспансерному обліку з приводу глаукоми. Яким методом можна визначити рівень внутрішньоочного тиску?

- A * Тонометрії
- B Візометрії
- C Периметрії
- D Кампіметрії
- E Офтальмоскопії

9. У хворого проникаюче поранення ока. Профілактику якого захворювання Вам необхідно провести?

- A *Правця
- B Чуми
- C Бешихи
- D Сифілісу
- E Токсоплазмозу

10. Хворий скаржиться на біль в оці і відповідній половині голови, значне зниження зору, нудоту, блювання. Внутрішньоочний тиск 60 мм рт.ст. Що можна запідозрити?

- A *Гострий напад глаукоми
- B Гострий іридоцикліт
- C Герпетичний кератит
- D Повзучу виразку рогівки
- E Кератит