

Медсестринство в оториноларингології

1. Хворий у коматозному стані, дихає через трахеостому. Чергова медсестра реанімаційного відділення помітила, що дихання в нього стало частішим, з'явився ціаноз шкіри. Яке незалежне втручання може виконати медична сестра?

- A. *Перевірити прохідність трахеостомічної трубки
- B. Ввести спазмолітики
- C. Попередити западання язика
- D. Ввести серцеві засоби
- E. Налagodити інгаляцію зволоженого кисню

2. Яка проблема може виникнути при видаленні сірчаної пробки із зовнішнього слухового ходу методом промивання?

- A. *Втрата рівноваги
- B. Отогенний сепсис
- C. Отогенний менінгіт
- D. Абсцес мозку та мозочка
- E. Синустромбоз

3. Пальцеве дослідження носоглотки проводиться для діагностики:

- A. *Аденоїдів
- B. Гострого тонзиліту
- C. Гострого фарингіту
- D. Гострого гаймориту
- E. Хронічного тонзиліту

4. У хворого 45 років після потрапляння води у вухо раптово погіршився слух, з'явився шум у вусі, відчуття розпирання, аутофонія. Назвіть пріоритетну проблему пацієнта?

- A. *Сірчана пробка
- B. Гострий отит зовнішнього вуха
- C. Стороннє тіло зовнішнього слухового ходу
- D. Гострий середній катаральний отит
- E. Гострий середній гнійний отит

5. Пацієнт, який впродовж 5 років працює на пилорамі, звернувся зі скаргами на зниження слуху, шум у вусі. Медсестра повинна підготувати пацієнта до:

- A. *аудіометрії
- B. отоскопії
- C. діафаноскопії
- D. рентгенографії вуха
- E. вестибулометрії

6. У ЛОР-відділення поступив хворий з переломом кісток носа, носовою кровотечею. Які інструменти необхідно підготувати медичній сестрі?

- A. *Носове дзеркало, носові елеватори
- B. Кровозупинні затискачі, скальпель
- C. Пінцет, кровозупинні затискачі
- D. Шпатель, кровозупинні затискачі
- E. Корнцанг, роторозширювач