

Крок М Сестринська справа Медсестринство в педіатрії

Здорова дитина

1, Мама дитини 6-ти місяців яка знаходиться на штучному вигодовуванні цікавиться у патронажної медичної сестри: " З якого віку можна давати дитині яєчний жовток?"

- A. * 3 7 місяців
- B. 3 5 місяців
- C. 3 10 місяців
- D. 3 9 місяців
- E. Не давати до 1 року

2. Проти яких інфекційних хвороб, згідно календаря профілактичних щеплень, проводиться вакцинація здоровим доношеним новонародженим дітям в пологовому будинку?

- A. *Гепатиту В, туберкульозу
- B. Кору, краснухи, епідемічного паротиту
- C. Дифтерії, кашлюку, правця
- D. Поліомієліту, менінгококової інфекції
- E. Гемофільної інфекції

3.Частота випорожнень у здорової дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні може становити:

- A * 5-7 разів на добу
- B 10-12 разів на добу
- C 12-15 разів на добу
- D 15-17 разів на добу
- E 17-20разів на добу

4. Для визначення добового діурезу у дітей старше одного року використовують формулу:

- A * $600+100x (n-1)$
- B $500+100x (n-1)$
- C $600-100x (n-1)$
- D $400+100x (n-1)$
- E $500-100x (n-1)$

5. Мале тім'ячко у новонароджених дітей розташовано між кістками:

- A** * Потиличними та тім'яними
- B** Лобними та тім'яними
- C** Лобними
- D** Скроневими та тім'яними
- E** Лобними та скроневими

6. Мати проводить підготовку дитини до грудного вигодовування і виявила затруднене носове дихання, пов'язаного з великою кількістю слизу. Яким розчином потрібно промити носові ходи?

- A** * Фізіологічним розчином
- B** Нафтізином
- C** Галазоліном
- D** Ефедрином
- E** Алое

7. У плода мале коло кровообігу:

- A** * Не функціонує
- B** Функціонує
- C** Функціонує з 32 тижня вагітності
- D** Функціонує з 35 тижня вагітності
- E** Функціонує з 28 тижня вагітності

8. Бокові тім'ячка, які розташовані між потиличною, тім'яною та скроневою кістками закриваються у доношеної здорової дитини:

- A** * До народження
- B** 2-3 місяця життя
- C** 8-10 місяців життя
- D** 4-5 місяців життя
- E** 5-8 місяців життя

9. Дитині 3 місяці, знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулась до медичної сестри із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, втрату маси тіла. Дані симптоми дозволяють запідозрити:

- A** * Недогодовування
- B** Перегодовування
- C** Кишковий токсикоз
- D** Просту диспепсію
- E** Парентеральну диспепсію

10. Який режим годування доцільно призначити здоровій доношеній дитині віком 5 днів?

- A** * По вимозі дитини
- B** Кожні 4 години
- C** Кожні 5 годин
- D** Кожні 3,5 годин
- E** Кожні 6 годин

11. Дитині віком до 6 місяців необхідно проводити гігієнічну ванну:

- A** * Щодня
- B** Через день
- C** Раз у 4 дні
- D** Раз у 5 днів
- E** Раз у 7 днів

12. Мати дитини 2 років питає у медичної сестри: “Скільки молочних зубів повинно бути у її дитини?”

- A** * 20
- B** 12
- C** 30
- D** 8
- E** 32

13. При огляді новонародженої дитини на 3-ю добу життя виявлено зменшення маси тіла дитини. Загальний стан дитини задовільний. З чим пов’язана дана проблема?

- A** * Фізіологічна втрата маси тіла
- B** Статева криза
- C** Сечокислий інфаркт нирок
- D** Транзиторний дисбактеріоз
- E** Токсична еритема

14. Дитяча медична сестра, навчає матір новонародженої дитини щодо догляду за пуповинним залишком (пупковою ранкою) Виберіть найбільш доцільну рекомендацію:

- A** * Підтримувати пуповинний залишок (пупкову ранку) завжди сухим та чистим
- B** Накривати пуповинний залишок (пупкову ранку) підгузниками

С Обробляти пуповинний залишок (пупкову панку) 1\% р- м діамантового зеленого

Д Накладати стерильну пов'язку

Е Обробляти пуповинний залишок (пупкову ранку) 96° розчином спирту етилового

15. Де знаходиться кільце пупкового канатика у доношеної новонародженої дитини?

А *Посередині між лоном та мечоподібним відростком

В У нижній третині живота

С У верхній третині живота

Д Біля лона

Е Біля мечоподібного відростка

16. Якої маси тіла повинна досягти недоношена дитина, щоб їй було зроблено щеплення проти туберкульозу?

А *2000 г

В 2200 г

С 1500 г

Д 1800 г

Е 3000 г

17. Нетрадиційний метод догляду за немовлятами з малою масою тіла – це метод “мати-кенгуру”, який здійснюється забезпеченням:

А *Постійного контакту “шкіра до шкіри” між матір'ю і дитиною

В Контакт “шкіра до шкіри”, який підтримується тільки світовий день

С Контакт “шкіра до шкіри”, який підтримується тільки вночі

Д Контакт “шкіра до шкіри” на протязі 10 годин на добу

Е Контакт “шкіра до шкіри” на протязі 15 годин на добу

18. Ранній неонатальний період становить:

А *Перші 7 днів життя дитини

В Перші 3 дні життя дитини

С Перші 5 днів життя дитини

Д Перші 10 днів життя дитини

Е Перші 14 днів життя дитини

19. Дитина виписана з пологового будинку додому. В даний час дитині 6 днів: загальний стан задовільний, груди смокче активно, спить на добу 22 години,

рефлекси відповідають даному періоду. Якому періоду відповідає даний вік?

- A.* *Ранньому неонатальному
- B.* Пренатальному
- C.* Пубертатному
- D.* Грудному
- E.* Інтранатальному

20. Як довго Ви будете користуватися формулою Фінікільштейна для розрахунку добової кількості молока дитині?

- A* *Перші 10 днів життя дитини
- B* Перші 7 дні життя дитини
- C* Перші 3 тижні життя дитини
- D* Перший місяць життя дитини
- E* На протязі перших двох місяців життя дитини

21. Дитині 6 місяців. Здорова. Знаходиться на природному вигодовуванні. В якому віці і який прикорм треба ввести дитині?

- A* * 3 6 місяців, овочеve пюре
- B* 3 6 місяців, 20\% манна каша
- C* 3 6 місяців, кефір
- D* 3 4 місяців, овочеve пюре
- E* 3 5 місяців, сік фруктовий

22. Народилася здорова доношена дитина. Оцінка за шкалою Апгар 9 балів. Вкажіть тривалість контакту “шкіра до шкіри” у пологовій залі.

- A* * Не менше 2 годин
- B* 40 хвилин
- C* 1 година
- D* 3 години
- E* Постійно

23. Дитині 1 місяць. На природному вигодовуванні. При плановому огляді мама скаржиться на періодичне занепокоєння дитини. Вкажіть достовірні ознаки недостатнього отримання дитиною грудного молока.

- A* * Приріст маси менше 500 г за місяць і кількість сечовипускань менше 6 раз за добу
- B* Приріст маси 600 г за місяць
- C* Приріст маси 800 г за місяць

D Кількість сечовипускань менше 20-25 разів за добу

E Приріст маси 750 г за місяць

24. Дитині 9 місяців. Знаходиться на грудному вигодовуванні, прикорми введені своєчасно. Мати запитує медичну сестру: “До якого віку бажано годувати дитину груддю?”

A * До двох років

B До 1 року

C До 9 місяців

D До 6 місяців

E До 7 місяців

25. Дитині 5 днів. Виписана з пологового будинку з діагнозом “здорова”. В який термін медичній сестрі необхідно провести первинний патронаж?

A * Через день після огляду дитини лікарем

B У 2 тижні

C У 3 тижні

D В 1 місяць

E Протягом 1 тижня

26. На профілактичному огляді дитина віком 3 тижні. Дитина здорова. Скарт немає. Мати запитала медичну сестру: “З якого віку можна користуватися сосками і пустушками?”

A * Не використовувати взагалі

B З 1 місяця

C З 6 місяців

D З 2 місяців

E З 3 місяців

27. Дитині 10 днів. Здорова. Мати скаржиться на періодичне зригування після годування груддю. Яка анатомо-фізіологічна особливість сприяє цьому стану?

A * Слабкість кардіального сфінктера шлунка

B Підвищена секреторна активність шлунка

C Знижена секреторна активність шлунка

D Недостатній розвиток пілоричного сфінктера шлунка

E Підвищена перистальтика шлунка

28. Медична сестра при огляді півторамісячної дитини виявила відкрите мале

тім'ячко. Дитина від нормально протікаючої доношеної вагітності.

Народилася здоровою на грудному вигодовуванні. Вкажіть термін закриття малого тім'ячка у немовлят.

A *До 3-х місяців.

B До 1-го місяця.

C До 2-х місяців.

D До 6-ти місяців.

E До 1-го року.

29. Дитина 4-х місяців на грудному вигодовуванні, нервово-психічний та фізичний розвиток відповідає вікові. З якого віку слід ввести дитині перший прикорм?

A * З 6-ти місяців.

B З 4-х місяців.

C З 3-ти місяців.

D З 7-ми місяців

E З 8-ми місяців

30. Які харчові продукти слід ввести в раціон дитини 1-го року життя з метою корекції потреби у вітамінах?

A * Фруктові та овочеві соки.

B Молочно-зернові каші.

C Овочеві відвари.

D Білок курячого яйця.

E М'ясний фарш.

31. При антропометричному дослідженні новонародженого хлопчика встановлено такі показники: маса тіла 3600 г, зріст 54 см, обвід голови 42 см, обвід грудної клітини 34 см. Температура тіла 36,8°C. Який показник не відповідає нормі?

A *Обвід голови

B Зріст

C Маса тіла

D Обвід грудної клітини

E Температура тіла

32. При проведенні ранкового туалету в лікарняній палаті медична сестра проводила підмивання 2-х річної дівчинки в напрямку від лобка до анального отвору. Якою анатомічною особливістю сечовивідних шляхів можна пояснити

дії медсестри?

A *Сечовий канал короткий та широкий

B Слизова оболонка сечового міхура ніжна і пухка

C Стінка сечоводів атонічна

D М'язові волокна сфінктерів сечоводів недорозвинені

E Еластичні волокна мисок недорозвинені

33. Під час першого патронажу мати поскаржилась на збільшення і нагрудання грудних залоз у дитини, появу з них білуватого секрету. Збільшення симетричне, шкіра над грудними залозами не змінена. Загальний стан дитини не змінений. Яке втручання повинна здійснити медична сестра?

A *Накласти стерильну суху пов'язку

B Вичавити секрет

C Зробити масаж грудних залоз

D Накласти напівспиртовий компрес

E Накласти олійний компрес

34. На профілактичному огляді дитина 6-и місяців, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Треба провести консультування матері з вигодовування та харчування дитини. Яку страву можна порекомендувати для введення в раціон цієї дитини?

A *Картопляне пюре

B Фарш з курятини

C Фарш з річкової форелі

D Яєчний жовток

E Яблучний сік

35. Під час спілкування з матір'ю новонародженого медсестра повідомила їй, що дитину тимчасово планується годувати через назогастральний зонд. Який рефлекс відсутній у цієї дитини?

A *Ковтальний рефлекс

B Захисний рефлекс

C Пошуковий рефлекс

D Хапальний рефлекс

E Рефлекс повзання

36. Під час профілактичного антропометричного обстеження дитини 5-и місяців з'ясувалось, що за місяць вона набрала 500г маси тіла. Мати також, поскаржилась що дитина останнім часом стала неспокійною, погано спить. Яке

додаткове обстеження треба провести цій дитині під час профілактичного огляду?

- A** *Контрольне годування
- B** Вимірювання зросту
- C** Вимірювання обводу голови
- D** Вимірювання обводу грудної клітини

37. Під час патронажу до дитини 2-х місяців медична сестра оглянула місце введення БЦЖ-вакцини. Яка реакція на місці введення БЦЖ-вакцини вважається нормальною у дитини цього віку?

- A** *Інфільтрат 5-10 мм з кірочкою у центрі
- B** Інфільтрат 10-15 мм
- C** Виразка 10 мм
- D** Рожевий рубчик 4-6 мм
- E** Деепітелізований рубчик

38. Одним з критеріїв виписування дитини, народженої з малою масою тіла, з пологового будинку є маса тіла, що дорівнює або більша:

- A** *2000 г
- B** 3500 г
- C** 1500 г
- D** 2500 г
- E** 3000 г

39. Медсестра радить матері використовувати метод “мати-кенгуру” при вазі дитини більше:

- A** *1000 г
- B** 800 г
- C** 1500 г
- D** 2500 г
- E** 2000 г

40. Медична сестра слідкує, щоб температура навколишнього середовища в палаті спільного перебування матері та дитини становила:

- A** *22 – 25 оС
- B** 20 – 22оС
- C** 18 – 20 оС
- D** 25 – 28оС
- E** 19 – 22оС

41. На прийом в кабінет здорової дитини прийшла мама з дитиною 1-го місяця. Зі слів матері дівчинка не витримує перерви між годуваннями, неспокійна, рідко мочиться, зцідити молоко після годування матері не вдається. Тактика медичної сестри в даному випадку?

A *Провести контрольне зважування

B Догодовувати дитину сумішшю

C Зменшити час між годуваннями

D Поїти дитину між годуваннями водою

E Збільшити час годування

42. Вкажіть, яку місткість становить шлунок в новонародженого?

A *30 – 35 мл

B 85 – 100 мл

C 200 – 250 мл

D 250 – 300 мл

E 100 – 150 мл

43. Коли повинно бути перше прикладання новонародженої здорової дитини до грудей в пологовому будинку?

A *В перші 30 хв після народження.

B Через 2,5 год.

C Через 40 хв.

D Через 3 год.

E Через 3,5 год.

44. Який основний метод годування недоношених новонароджених з терміном гестації до 30 тижнів?

A *Через зонд

B Годування грудьми

C З чашки

D Годування грудьми або з чашки

E З ложечки

45. Вакцинацію проти гепатиту В починають у віці:

A *В 1-ий день життя

B 3 місяці

C 4 місяці

D На 3-4 добу

E 1 рік

46. Який вид вигодовування здорової доношеної дитини на 1-му році життя вважається сучасним та найоптимальнішим:

- A** *Вільне грудне вигодовування
- B** Штучне вигодовування за режимом
- C** Грудне вигодовування за режимом
- D** Вільне штучне вигодовування
- E** Змішане вигодовування за режимом

47. Які обов'язкові обстеження проводять новонародженій дитині в пологовому будинку:

- A** *На фенілкетонурію
- B** Загальний аналіз крові
- C** На непрямий білірубін
- D** Загальний аналіз сечі
- E** Бактеріологічне дослідження калу

48. Яка причина появи у немовлят на кінчику, крилах носа та на щоках жовто-білих цяток:

- A** *Накопичення секрету в протоках сальних залоз
- B** Нагромадження секрету у протоках потових залоз
- C** Гнейс
- D** Прояви алергічного діатезу
- E** Молочний струп

49. Після огляду здорової новонародженої дитини першого дня життя лікар призначив проведення щеплення проти гепатиту В. Мама дитини поцікавилась, які ще щеплення проводять новонародженим у пологовому будинку?

- A** БЦЖ на 3-5-й день
- B** Проти кору, краснухи на 3-й день
- C** Проти поліомієліту на 3-й день
- D** Проти дифтерії на 2-й день
- E** Проти епідемічного паротиту в 1-й день

50. Ви - медсестра палати новонароджених. Дитина Л. народилася доношеною з масою 3450 г, зростом – 52 см, знаходиться на грудному вигодовуванні. На третій день життя маса тіла знизилась до 3300 г. Ви мамі пояснили, що це фізіологічна втрата маси тіла. Мама поцікавилась, коли

відновиться маса тіла?

A *Кінець 1-го - початок 2-го тижня життя

B На 5-й день

C На 15-й день

D До кінця першого місяця життя

E До кінця третього тижня життя

51. Ви - дільнична медсестра проводите патронажне відвідування новонародженої дитини, даєте рекомендації мамі щодо грудного вигодовування. Що з нижчеперерахованого належить до принципів успішного грудного вигодовування?

A *Заохочуване грудне вигодовування на вимогу дитини

B Новонародженим обов'язково слід давати штучні засоби, які імітують груди

C Новонароджених годують 5 разів на добу

D Вночі новонароджених дітей не годують [перерва 8 годин]

E Інформування вагітних і породіль про переваги штучного вигодовування

52. Ви - медсестра дитячої поліклініки проводите антропометрію дитині 5 місяців. На скільки сантиметрів збільшиться зріст за 5-й місяць життя?

A *2,5 см

B 3 см

C 4 см

D 1,5 см

E 0,5 см

53. Який зріст має дитина в 1 рік?

A *75 см

B 50см

C 90см

D 85см

E 100 см

54. Визначіть масу тіла дитини віком 3 місяці, якщо вона народилася з масою тіла 3100 г.

A *5300 г

B 7900 г

C 6500 г

D 9100 г

E 8500 г

55. На третю добу у новонародженої дитини шкіра пожовтіла, але стан не погіршився. Це пояснюється :

A *Фізіологічною жовтяницею

B Сечокислим інфарктом

C Токсичною еритемою

D Гемолітичною хворобою

E Статевим кризом

56. Яка частота дихання у новонародженої дитини?

A 40 – 60 за 1 хв.

B 30 – 35 за 1 хв.

C 20 – 25 за 1 хв.

D 35 – 45 за 1 хв.

E 16 – 18 за 1 хв.

57. Медична сестра оцінює фізичний розвиток дитини 2-х місяців. Які показники прибавки маси і зросту за другий місяць здорової дитини?

A 800 г, 3см

B 700г, 3см

C 700г, 2см

D 800 г ,2см

E 750г;2,5см

58. Дитина 6,5 місяців знаходиться на природному вигодовуванні, маса при народженні 3150 г, отримує 10\% молочну кашу, сік. Для введення дитині наступного пригодовування медична сестра навчає матір готувати овочеve пюре. Вкажіть овочі, які найдоцільніше використовувати для приготування даної страви.

A * Картопля, капуста, морква

B Буряк, морква, капуста

C Капуста, картопля, помідори

D Картопля, перець, буряк

E Морква, цибуля, баклажани.

59. Хлопчик 6 місяців знаходиться на природному вигодовуванні, маса при народженні 3600 г., проживає з батьками в сільській місцевості. У плані медсестринського догляду медсестра планує введення соку поступово зі збільшенням його об'єму. Вкажіть сік, який найдоцільніше давати вперше

даній дитині

A * Яблучний

B Банановий

C Гранатовий

D Томатний

E Апельсиновий.

60. Дитині 2 місяці, знаходиться на природному вигодовуванні, годування проводиться за вимогою дитини. Після хвороби в матері з'явилися перші симптоми гіпогалакції. Вкажіть найдоцільніші дії медсестри.

A * Провести контрольне зважування

B Перевести на змішане вигодовування

C Призначити матері пролактин

D Догодовувати молочною сумішшю

E Почати вводити пригодовування.

61. Дитина народилася від I вагітності, фізіологічних пологів з масою тіла 2800 г., з ростом 48 см. За шкалою Апгар – 8 б. При огляді: здорова, t° – 36,5°C. Планується специфічна профілактика інфекційних хвороб згідно з календарем щеплень. Визначте обов'язкові щеплення, які необхідно провести даній дитині в пологовому стаціонарі.

A * Проти гепатиту В, туберкульозу

B Проти кашлюку, дифтерії

C Проти поліомієліту, гемофільної інфекції

D Проти кору, краснухи

E Проти правцю, паротитної інфекції.

62. Дитина народилася від II вагітності при терміні гестації 35 тижнів з масою тіла 1800 г. Через 24 години після годування дитини грудним молоком провели обстеження на фенілкетонурию. Результат негативний. Вкажіть обов'язкове скринінгове обстеження, яке потрібно провести дитині до виписування з пологового стаціонару.

A * На вроджений гіпотиреоз

B На цукровий діабет

C На алергічний діатез

D На гіпофізарний нанізм

E На аномалії розвитку.

63. Дитина 6 місяців, яка народилася від II вагітності, фізіологічних пологів, з

масою тіла 2800 г., з ростом 46 см., знаходиться на природному вигодовуванні; має 2 нижні медіальні різці, готується до вакцинації, знаходиться на прийомі в дитячій поліклініці. Вкажіть найінформативніше обстеження для оцінки фізичного розвитку дитини.

- A** * Виміряти зріст дитини
- B** Підрахувати частоту пульсу
- C** Виміряти артеріальний тиск
- D** Підрахувати кількість дихальних рухів
- E** Виміряти температуру тіла.

64. Ви сімейна медична сестра. Коли ви вперше порекомендуєте ввести в раціон дитини фруктовий сік?

- A** * 6 місяців
- B** 3 місяці
- C** 1 місяць
- D** 8 місяців
- E** 4 місяці

65. Ви сімейна медична сестра, проводите патронаж до новонародженої дитини. Мама скаржиться на зменшення лактації. Ваші рекомендації.

- A** * Часте прикладання до грудей
- B** Перевести на штучне вигодовування
- C** Догодовувати адаптованими молочними сумішами
- D** Догодовувати розведеним коров'ячим молоком
- E** Догодовувати молочною кашею

66. Родичі новонародженої дитини запитують у медсестри, яку масу тіла має дитина. Надайте відповідь, коли дитину будуть зважувати:

- A** * Через 2 години після народження
- B** Через півгодини після народження
- C** Через 1 годину після народження
- D** Через 3 години після народження
- E** Через 4 години після народження

67. В поліклініці на прийомі матір з дитиною 5 міс. скаржиться на слинотечу у дитини і цікавиться, в якому віці повинні прорізатись перші зуби?

- A** * 6 – 8 міс.
- B** 2 – 4 міс.
- C** 4 – 5 міс.

D 10 – 11 міс.

E 11 – 12 міс.

68. В пологовому будинку після огляду лікарем новонародженої дитини віком 3 дні заплановано щеплення проти туберкульозу. Яким способом медсестра введе вакцину БЦЖ?

A * Внутрішньошкірно

B Внутрішньом'язово

C Внутрішньовенно

D Підшкірно

E Через рот

69. Медсестра під час патронажу до новонародженого рекомендує щоденні гігієнічні ванни та дотримування правил гігієни при догляді. Недостатність якої із функцій шкіри це обумовлює?

A * Захисної

B Терморегуляторної

C Дихальної

D Потовидільної

E Утворення вітамінів

70. При огляді ротової порожнини дитини медсестра відмітила наявність 8 різців та 4 малих корінних зубів. Для якого віку дитини це характерно?

A * 16 місяців

B 20 місяців

C 22 місяців

D 12 місяців

E 8 місяців

71. При огляді 2 місячної дитини в кабінеті здорової дитини поліклініки медсестра відмітила наявність фізіологічного вигину хребта. Який фізіологічний вигин повинен бути в цьому віці?

A * Шийний лордоз

B Поперековий лордоз

C Грудний кіфоз

D Грудний лордоз

E Шийний кіфоз

72. Вік дитини 1 рік. Медсестра виміряла зріст дитини. На скільки

сантиметрів виросла дитина за перший рік?

A * 25 см

B 10 см

C 15 см

D 20 см

E 30 см

73. Патронажна медична сестра проводить обстеження 12-місячної дитини. Що з перерахованого відповідає даному віку?

A * Закриття великого тім'ячка

B Сплющення потилиці

C Розвиток тім'яних горбів

D “Браслети” на передпліччях

E Розгорнутість країв грудної клітки

74. Під час огляду новонародженої дитини палатна медична сестра визначила, що в акті дихання бере участь діафрагма. Чим можна пояснити діафрагмове дихання у новонародженого:

A * Горизонтальним розташуванням ребер

B Недостатня м'язова активність

C Функціональною незрілістю дихального центру

D Зменшенням просвіту дихальних шляхів

E Дозріванням дихальних альвеол

75. Дитину 2 місяців необхідно раптово перевести на штучне вигодовування. Яку суміш в даному випадку медичній сестрі доцільно порекомендувати матері?

A * Адаптовану

B Неадаптовану

C Солодку

D Кисломолочну

E Цільне коров'яче молоко

76. В пологовому будинку медичній сестрі необхідно провести обстеження новонародженої дитини на фенілкетонурію. Вкажіть місце забору матеріалу для даного обстеження:

A * Латеральна поверхня п'ятки між IV і V пальцем

B Медіальна поверхня п'ятки

C З пупкової вени

D 3 вени

E 3 пальця

77. Народилася здорова доношена дівчинка. Під час проведення першого туалету новонародженого потрібно провести профілактику офтальмії. Чим проводять профілактику офтальмії?

A *0,5\% еритроміциновою маззю

B 30\% розчином сульфацилу натрію

C 0,02\% розчином фурациліну

D Фізіологічним розчином

E Краплі Софрадекс

76. Медична сестра під час медичного профілактичного огляду дитини віком 5 міс. встановила: фізичний та психомоторний розвиток дитини відповідає віку; вигодовування виключно грудне. З якого віку рекомендовано вводити в раціон дитини продукти прикорму?

A *3 6 міс.

B 3 3 міс.

C 3 4 міс.

D 3 5 міс.

E 3 7 міс.

77. Медична сестра під час медичного профілактичного огляду дитини віком 6,5 міс. при розмові з матір'ю встановила, що останній раз дитину зважували 3 міс. тому. З якою кратністю необхідно зважувати дітей на першому році життя?

A *Щомісячно

B Один раз в квартал

C Один раз в 6 міс.

D Один раз на рік

E Довільно

78. Серед перерахованих проблем виберіть характерні для недоношеної дитини:

A *Гіпотермія

B Гіпертермія

C Брадикардія

D Гіпертонус м'язів

E Гіперрефлексія

79. Дівчинка віком 2 дні від І вагітності І пологів. До медсестри звернулася

мати дитини з питанням: "Коли почне активно прибувати молоко?"

A * На 3-4 добу після пологів

B На 10 добу після пологів

C Через 2 тижні після пологів

D Через 4-6 тижнів після пологів

E Через 2 місяці після пологів

80. Дитина стежить очима і повертає голівку за рухами яскравим предметом, у напрямку звуку, добре утримує голову у вертикальному положенні.

Який вік дитини?

A * 3 місяці

B 6 місяців

C 1 місяць

D 1 рік

E 9 місяців

81. Медсестра проводить допологовий патронаж. Які принципи успішного грудного вигодовування вона включить в план бесіди?

A * Інформувати всіх вагітних про переваги і методи грудного вигодовування

B Інформувати рідних про штучні молочні суміші

C Інформувати батьків про харчову добавки

D Інформувати батьків про прикорм

E Інформувати вагітних про режим дня

82. Під час спілкування з мамою дівчинки 4 днів медсестра виявила, що у дитини почастишали випорожнення до 5-7 разів на добу. Що може бути причиною?

A * Транзиторний катар кишок

B Ентероколіт

C Статевий криз

D Метеоризм

E Фізіологічна втрата маси тіла

83. Медсестра здійснює догляд за дитиною, яка народилась недоношеною з терміном гестації 29 тижнів. Який метод вигодовування вона вибере?

A * Через зонд

B Груддю

C З пляшечки

D З ложечки

E 3 чашечки

84. Дитина, що народилася недоношеною, за 5 днів життя втратила 10\% маси, патологічних змін в стані дитини не має. Медична сестра пояснить матері, що це характерно для:

A *Фізіологічної втрати маси

B Зневоднення

C Гіпотрофії

D Диспепсії

E Сальмонельозу

85. В палаті спільного перебування матері та новонародженого, який народився доношеним, мати перелякана тим, що її хлопчик вимагає частого прикладання до грудей. Надайте рекомендації матері щодо частоти прикладання до грудей?

A *Годувати за вимогою новонародженого

B 7 разів на добу

C 6 разів на добу

D 5 разів на добу

E 10 разів на добу

86. В кабінеті здорової дитини Ви проводите контрольне зважування. Якої умови необхідно дотримуватись при проведенні контрольного зважування?

A *Зважувати перед та після годуванням

B Зважувати перед годуванням

C Зважувати після годуванням

D Зважувати під час годуванням

E Зважувати через 2 години після годування

87. Визначіть за формулою антропометричні показники дитини 1 року, якщо маса при народженні – 3000г, зріст – 50 см:

A *10200г, зр – 75 см

B 11200г, зр – 78 см

C 9500г, зр – 72 см

D 8600г, зр – 70 см

E 12000г, зр – 80 см

88. Яке співвідношення білків, жирів та вуглеводів в грудному молоці?

A *1:3:6

B 1:1:4

C 1:2:4

D 3:3:6

E 1:2:3

89. В якому віці здорова дитина починає сидіти, промовляє склади „ба”, „ма”?

A *6 міс.

B 3 міс.

C 4 міс.

D 8 міс.

E 10 міс.

90. Об’ємним методом визначити добову потребу в їжі дитини 3 міс.:

A * $1/6$ маси тіла

B $1/5$ маси тіла

C $1/7$ маси тіла

D $1/8$ маси тіла

E $1/9$ маси тіла

91. Визначіть за формулою добову кількість сечі у дівчинки 5 років.

A *1000 мл

B 800 мл

C 600 мл

D 500 мл

E 1200 мл

92. Визначіть, які харчові продукти можуть складати третій прикорм дитини, яка має нормальну масу тіла і знаходиться на природньому вигодовуванні:

A * Кефір, ацидофільне молоко.

B М’ясні фрикадельки.

C 10% гречана каша.

D 5% молочна каша.

E Овочеve пюре.

93. Первинна проблема, що може виникнути у дитини грудного віку при вживанні

недостатньої кількості їжі:

A * Відставання в масі тіла.

B Відставання в зрості.

C Збільшення маси тіла.

D Збільшення діурезу.

E Зниження АТ.

94. Найнезрілішою частиною головного мозку у немовлят є:

A * Кора півкуль головного мозку.

B Гіпоталамус.

C Довгастий мозок.

D Таламус.

E Спинний мозок.

95. Згідно наказу МОЗ №152 профілактика офтальмії новонародженій дитині проводиться не пізніше 1 год. життя. Який засіб для цього необхідно підготувати?

A * 1\% тетрациклінова мазь

B 0,5\% гідрокортизонова мазь

C 30\% р-н альбуциду

D 0,25\% оксолінова мазь

E 0,25\% р-левоміцетину

96. Для проведення антропометрії в дитячу поліклініку прийшла мати з 4 - річною дитиною. За якою формулою перевіряється маса тіла дитини?

A * $10 + 2n$

B $75 + 5n$

C $80 + 2n$

D $90 + 3n$

E $95 + n$

97. Дитині 8 місяців. При обстеженні фізичний і нервово-психічний розвиток відповідає віку. До цього часу не хворіла. Вкажіть яка кількість зубів у даної дитини?

A * 4

B 2

C 6

D 8

E 10

98. Дайте рекомендацію батькам здорової доношеної дитини про

оптимальний тип вигодовування на I році життя:

A Вільне грудне вигодовування

B Грудне вигодовування за режимом

C Штучне вільне вигодовування

D Штучне вигодовування за режимом

E Змішане вигодовування

99. Консультативний прийом в кабінеті “Здорова дитина”. Дайте відповідь на запитання батьків: „Коли дитина починає самотійно сидіти?”

A *6 місяців

B 8 місяців

C 9 місяців

D 10 місяців

E 11 місяців

100. Ви прийшли на патронаж до новонародженої дитини 10 днів. Мати скаржиться на те, що в неї мало молока і дитина не витримує перерви між годуваннями. Зцідити молоко після годування не вдається. Що в першу чергу порекомендуєте мамі?

A *Провести контрольне зважування

B Догодовувати дитину сумішами

C Зменшити час між годуваннями

D Збільшити кількість годувань

E Провести водно – чайну паузу

101. Перший профілактичний огляд здорової новонародженої дитини згідно наказу № 149 від 20.03.08 року. Медсестра повинна здійснювати:

A * Через день після огляду лікаря;

B на сьомий день;

C в перші три дні після виписки з пологового відділення;

D в перший день після виписки з пологового відділення;

E в три тижні.

102. В якому віці ви рекомендують ввести в раціон дитини на природному вигодовуванні м'ясне пюре:

A * 6,5 – 7 місяців;

B 8 місяців;

C 4,5 місяців;

D 9 – 10 місяців;

E 12 місяців.

103. Медсестринське обстеження з метою контролю дотримання заходів теплового ланцюжка: перше вимірювання температури тіла новонародженого здійснюється:

A * Через 30 хв;

B через 5 хв;

C через 45 хв;

D через 60 хв;

E на другий день.

104. Новонароджена дівчинка народилася від передчасних пологів із гестаційним віком 33 тижні. Маса тіла - 1900 г, зріст - 40 см. Під час огляду спостерігається: кістки черепа м'які, вуха щільно прилягають до голови; шкіра зморшкувата, підшкірно-жирова тканина виражена слабо; пупкове кільце зміщене до лона; відкрита статева щілина. Укажіть ступінь недоношеності:

A. Недоношеність II ст.

B. Недоношеність III ст.

C. Недоношеність V ст.

D. Недоношеність I ст.

E. Недоношеність IV ст.

105. Медсестрі, яка працює в дитячому садку, потрібно провести розрахунок маси тіла дітей середньої групи. Яку формулу вона використає, щоб вирахувати приблизну масу тіла дитини віком 4-5 років?

A. $10+(2п)$

B. $75+(5-п)$

C. $100+6-(п-4)$

D. $63+3-(п-10)$

E. $100-8-(4-п)$

106. Ви - медсестра палати новонароджених, вимірюєте обвід голови новонародженої доношеної дитини, яка народилася з вагою 3300 г, довжиною тіла - 52 см. Який в нормі має бути обвід голови у даної дитини?

A. * 34-36 см

B. 37-39 см

C. 28-30 см

D. 27-29 см

E. 30-32 см

107. Патронажна медична сестра амбулаторії сімейної медицини оцінює температуру, вологість та еластичність шкіри новонародженої дитини. За допомогою

якого методу об'єктивного дослідження можна оцінити такі властивості шкіри?

- A. * Пальпації
- B. Перкусії
- C. Аускультатії
- D. Огляду
- E. Розпитування

108. У пологовому будинку народилась доношена, здорова дитина з масою тіла 3,500 кг. Оглядаючи дитину, медсестра визначає частоту дихання. Яка нормальна частота дихання в новонародженої дитини?

- A. *40-60/хв
- B. 80-90/хв
- C. 16-18/хв
- D. 30-40/хв
- E. 120-140/хв

109. Новонароджена дівчинка народилася від передчасних пологів із гестаційним віком 33 тижні. Маса тіла - 1900 г, зріст - 40 см. Під час огляду спостерігається: кістки черепа м'які, вуха щільно прилягають до голови; шкіра зморшкувата, підшкірно-жирова тканина виражена слабко; пупкове кільце зміщене до лона; відкрита статеві щілина. Укажіть ступінь недоношеності:

- A. *Недоношеність II ст.
- B. Недоношеність III ст.
- C. Недоношеність V ст.
- D. Недоношеність I ст.
- E. Недоношеність IV ст.

110. Медичній сестрі дитячого садочка для розрахунку енергемісткості раціону слід пам'ятати, що енергетична цінність 1 г білків становить:

- A. 4 ккал
- B. 9 ккал
- C. 10 ккал
- D. 5 ккал
- E. 8 ккал