

1. Пацієнт скаржиться на надсадний кашель, прогресуючу задишку, біль у грудній клітці, кровохаркання. Попередній діагноз — рак легень. До якого обстеження треба підготувати пацієнта для уточнення діагнозу?

- А. Колоноскопії
- В. Електрокардіографії
- С. Бронхоскопії з біопсією
- Д. ФГДС із біопсією
- Е. Іригоскопії

2. Який збудник найчастіше спричиняє розвиток післяпологового маститу?

- А. Стрептокок
- В. Анаеробні коки
- С. Золотистий стафілокок
- Д. Протей
- Е. Епідермальний стафілокок

3. У породіллі після народження посліду посилилася кровотеча. Матка м'яка, погано скорочується, під час огляду плаценти виявлено дефект часточки посліду. Яка акушерська маніпуляція застосовується у цьому разі?

- А. Огляд пологових шляхів
- В. Ручна ревізія порожнини матки
- С. Масаж матки на кулаці
- Д. Зовнішній масаж матки
- Е. Введення токолітичних препаратів

4. Під час оцінювання стану новонародженої дитини на 1-й хвилині життя виявлено: ЧСС — 120/хв, дихання регулярне, крик голосний, шкіра рожева, рухи активні, реакція на подразники жвава. Оцініть стан новонародженого за шкалою Апгар.

- А. 5 балів
- В. 7 балів
- С. 4 бали
- Д. 2 бали
- Е. 10 балів

5. Яка група лікарських засобів застосовується для лікування рухових порушень після травми мозку?

- А. Ноотропи
- В. Кортикостероїди
- С. Міорелаксанти
- Д. Антихолінергічні
- Е. Антikonвульсанти

6. Для профілактики якого специфічного ускладнення черевного тифу на 3-му тижні хвороби пацієнту треба дотримуватися ліжкового режиму?

- А. Печінкової недостатності
- В. Розриву селезінки
- С. Кишкової кровотечі
- Д. Рецидиву захворювання
- Е. Генералізації інфекції

7. Чоловік віком 58 років із тривалим рецидивним перебігом виразкової хвороби шлунку скаржиться на біль в епігастрії постійного характеру, що іррадіює в спину, значне схуднення, відразу до м'ясної їжі. Яке ускладнення, наймовірніше, розвинулося у пацієнта?

- А. Шлункова кровотеча
- В. Пілоростеноз
- С. Пенетрація
- Д. Малігнізація
- Е. Перфорація

8. Жінка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість і гострий біль у грудній клітці справа, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилі тулуба в протилежний бік. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка лежить на правому боці. Дихання часте, поверхневе. Температура тіла — 37,4°C. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно над легеньми спостерігається чіткий легеневий звук. Аускультативно вислуховується шум тертя плеври. Для якого захворювання характерні ці клінічні показники?

- А. Міжреберної невралгії
- В. Негоспітальної пневмонії
- С. Екссудативного плевриту
- Д. Гострого бронхіту
- Е. Сухого плевриту

9. Яке ускладнення розвивається як наслідок ревматоїдного артриту?

- А. Невралгія
- В. Гарячка
- С. Адинамія
- Д. Астенія
- Е. Анкілоз

10. Для якого захворювання характерні такі зміни в загальному аналізі сечі: сеча каламутна, з осадом і пластівцями, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (менше 1 г/л)?

- А. Гострого гломерулонефриту
- В. Ниркової недостатності
- С. Гострого пієлонефриту
- Д. Сечокам'яної хвороби
- Е. Хронічного гломерулонефриту

11. Вкажіть типовий симптом, характерний для хронічної серцевої недостатності.

- A. набряки на нижніх кінцівках
- B. крововиливи на шкірі
- C. пітливість
- D. набряки на обличчі
- E. підвищення температури тіла

12. Вкажіть причину ранньої післяпологової кровотечі, яку можна виявити, оглядаючи послід.

- A. порушення зсідання крові
- B. защемлення плаценти
- C. затримка частин плаценти
- D. порушення виділення плаценти
- E. щільне прикріплення плаценти

13. Пацієнтка після струмектомії скаржиться на млявість, загальну слабкість, зниження працездатності та пам'яті, мерзлякуватість, підвищену сонливість. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, лущиться, не береться в складку, волосся сухе, ламке, випадає. Пульс — 54/хв, ритмічний, АТ — 100/60 мм рт. ст. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. гіпотиреозу
- B. гіпертиреозу
- C. цукрового діабету
- D. акромегалії
- E. атеросклерозу

14. Чоловік віком 45 років після емоційного перенапруження раптом відчув різкий головний біль, спостерігається блювання. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Визначається ригідність потиличних м'язів. Артеріальний тиск — 200/110 мм рт. ст. Отриманий у результаті люмбальної пункції ліквор забарвлений кров'ю. Для якого захворювання це характерно?

- A. геморагічного інсульту
- B. субарахноїдального крововиливу
- C. ішемічного інсульту
- D. дисциркуляторної енцефалопатії
- E. транзиторного порушення мозкового кровообігу

15. Яке додаткове обстеження треба провести пацієнту для виявлення конкрементів у нирках?

- A. УЗД
- B. бронхоскопію
- C. іригоскопію
- D. ректороманоскопію
- E. холецистографію

16. У чоловіка розвинувся напад задишки з різко утрудненим видихом, відчуття стиснення за грудиною, сухий кашель. Об'єктивно спостерігається: положення ортопное, акроціаноз, на відстані чути свистячі хрипи. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- A. набряк Квінке
- B. напад серцевої астми
- C. напад бронхіальної астми
- D. напад ларингостенозу
- E. напад ниркової кольки

17. Вода якої температури використовується для процедури постановки гірчичників?

- A. 25–27°C
- B. —
- C. 20–25°C
- D. 18–20°C
- E. 39–40°C

18. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для нападу бронхіальної астми?

- A. інспіраторна задишка
- B. крепітація
- C. експіраторна задишка
- D. біль у грудній клітці
- E. шум тертя плеври

19. З якою метою флакон із вушними краплями перед застосуванням треба підігріти у руках до температури тіла людини?

- A. для підсилення лікувального ефекту
- B. для уникнення запаморочення
- C. для кращої взаємодії з назальними краплями
- D. для попередження підвищення температури тіла
- E. для попередження виникнення кашлю

20. У пацієнта інфекційного стаціонару спостерігається тяжкий загальний стан, акроціаноз, сухість шкіри, загострення рис обличчя, блювання «фонтаном», діарея більше 15 разів на добу, періодичні судоми. Випорожнення водянисті, каламутні, з білими пластівцями. Який механізм розвитку діареї у пацієнта?

- A. Осмотичний
- B. Секреторний
- C. Ексудативний
- D. Інвазивний
- E. Запальний

21. У чоловіка віком 65 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово розвинувся напад задишки та кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння. Для якого ускладнення характерні ці симптоми?

- A. набряку легень
- B. бронхіальної астми
- C. інфаркту міокарда
- D. серцевої астми
- E. туберкульозу

22. Чоловік упродовж 10-ти років хворіє на дерматологічне захворювання, що загострюється в осінньо-зимовий період. Під час огляду виявлено: на шкірі волосистої частини голови, розгинальних поверхнях кінцівок спостерігаються рожево-червоні плями та бляшки, покриті сухими сріблястими лусочками, незначний свербіж. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. сухої себореї
- B. нейродерміту
- C. системного червоного вовчака
- D. червоного плоского лишая
- E. псоріазу

23. Яка шкала використовується для догоспітальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу?

- A. NIHSS
- B. FAST
- C. MMSE
- D. ABCDE
- E. NRS

24. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для кропив'янки?

- A. мерзлякуватість
- B. свербіж шкіри
- C. ціаноз шкіри
- D. слезотеча
- E. іктеричність шкіри

25. Чоловік віком 50 років скаржиться на різкий, інтенсивний, стискаючий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, ліве плече та ліву лопатку. Біль триває упродовж двох годин, не знімається нітроглицерином. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, відчуває страх смерті, шкіра та видимі сли-

зові оболонки бліді, ціаноз губ, пульс — 84/хв, ритмічний, АТ — 130/80 мм рт. ст., тони серця ослаблені. На ЕКГ спостерігається патологічний зубець Q у відведеннях I, aVL і V1- V2. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?

- A. Q-інфаркт міокарда, ангінозна форма
- B. Q-інфаркт міокарда, астматична форма
- C. —
- D. Q-інфаркт міокарда, аритмічна форма
- E. Q-інфаркт міокарда, гастралгічна форма

26. Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для проведення щеплення БЦЖ?

- A. підлопаткова ділянка
- B. верхній зовнішній квадрант сідниці
- C. середня третина внутрішньої поверхні передпліччя
- D. зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча
- E. передня поверхня стегна

27. Ускладненням якого захворювання є кретинізм?

- A. хвороби Аддісона
- B. нецукрового діабету
- C. вродженого гіпотиреозу
- D. хвороби Іценко-Кушинга
- E. цукрового діабету

28. Який симптом є часто позитивним у разі захворювань нирок?

- A. щоткіна-Блюмберга
- B. Кера
- C. Бабінського
- D. Пастернацького
- E. Ортнера

29. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, пітливість, задишку та кашель із виділенням гнійного з неприємним запахом моротиння у великій кількості (до 1 л на добу). Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Раку легень
- B. гострого бронхіту
- C. Пневмосклерозу
- D. Вогнищевої пневмонії
- E. Абсцесу легень

30. Вкажіть тривалість прийому родонової ванни.

- A. 30–40 хв
- B. 5–7 хв
- C. 50–60 хв
- D. 10–15 хв
- E. 1–2 хв

31. Який вигляд мокротиння характерний для раку легень?

- A. «Іржаве»
- B. «Перлине»
- C. Склоподібне
- D. «Малинового желс»
- E. Пінисте рожеве

32. Чоловік, який хворіє на гіпертонічну хворобу, після емоційного перенавантаження раптово втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: зіниці на світло не реагують, гіперемія обличчя, пульс — 110/хв, напружений, АТ — 200/110 мм рт. ст., лівий кут рота опущений, лівостороння геміплегія. Яке положення тіла треба надати пацієнту під час надання допомоги?

- A. На правому боці, з відхиленою назад головою
- B. На спині, з піднятим ножним кінцем ліжка
- C. На лівому боці, з відхиленою назад головою
- D. На животі, з повернутою на бік головою
- E. На спині, з піднятим головним кінцем ліжка

33. Пацієнту віком 38 років сімейним лікарем призначено внутрішньом'язові ін'єкції біциліну-5. Розчин якого препарату використовується для проведення внутрішньошкірної проби на індивідуальну чутливість до біциліну-5?

- A. Цефазоліну
- B. Бензилпеніциліну натрієвої солі
- C. Канаміцину
- D. Стрептоміцину сульфату
- E. Амоксициліну

34. Який із наведених нижче методів дослідження найінформативніший для діагностики туберкульозу легень?

- A. Спірометрія
- B. Рентгенографія органів грудної клітки
- C. Біохімічний аналіз крові
- D. Загальний аналіз крові
- E. Стерильна пункція

35. Вкажіть місце накладання електро-

ду з зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.

- A. Права рука
- B. —
- C. Ліва нога
- D. Ліва рука
- E. Права нога

36. Пацієнт скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, слабкість, зниження апетиту, біль у суглобах упродовж двох тижнів. З анамнезу відомо, що чоловік вживає ін'єкційні наркотики. Під час об'єктивного обстеження виявлено: жовтяниця шкіри і склер, збільшення печінки та селезінки, сеча темно-го кольору, випорожнення знебарвлені. Для якого захворювання характерні ці клінічні показники?

- A. Виспного тифу
- B. ВІЛ-інфекції
- C. Вірусного гепатиту С
- D. Кишкового ієрсиніозу
- E. Лептоспірозу

37. До пологового відділення шпиталізовано жінку у терміні вагітності 26–27 тижнів, яка скаржиться на появу незначних кров'янистих виділень з піхви вночі, в стані спокою. На момент огляду кровотеча припинилася, загальний стан задовільний. Який метод діагностики треба провести для уточнення діагнозу в цьому разі?

- A. Зовнішнє акушерське обстеження
- B. Внутрішнє акушерське обстеження
- C. Кольпоскопію
- D. Амніоскопію
- E. Трансвагінальне УЗД

38. Яка дія електричного струму проявляється у подразненні та збудженні тканин організму людини?

- A. Електролітична
- B. Біологічна
- C. Механічна
- D. Термічна
- E. —

39. За який термін часу треба зібрати сечу на дослідження для визначення вмісту глюкози?

- A. За 1 год
- B. —
- C. За 10 год
- D. За добу
- E. За 8 год

40. У пацієнта з діагнозом: хронічна ниркова недостатність, розвинулася уремія. Який симптом характерний для цього патологічного стану?

- А. Гіперемія шкірних покривів
- В. Аміачний запах з рота
- С. Підвищення апетиту
- Д. Збільшення лімфатичних вузлів
- Е. Підвищення температури тіла

41. Які лікарські засоби застосовуються впродовж усього життя як замісна терапія пацієнтам після струмектомії або тиреоїдектомії?

- А. Антибіотики
- В. Транквілізатори
- С. Антидепресанти
- Д. Тиреоїдні гормони
- Е. Наркотичні анальгетики

42. Чоловіку віком 37 років для лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки призначено фамотидин. Яка основна фармакологічна дія цього лікарського засобу?

- А. Антигістамінна
- В. Бактеріостатична
- С. Спазмолітична
- Д. Бактерицидна
- Е. Антисекреторна

43. Чоловік скаржиться на підвищення температури тіла, головний біль та різкий розпираючий біль у ділянці задньої поверхні шиї. Під час огляду виявлено щільний інфільтрат темно-червоного кольору, діаметром 7–8 см, різко болючий під час пальпації, покритий дрібними множинними отворами, з яких виділяється гнійна рідина. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- А. Бешихи
- В. Фурункулу
- С. Контагіозного моллюска
- Д. Карбункулу
- Е. Дерматофітії

44. Який препарат із групи нейролептиків використовується у пацієнтів з діагнозом: шизофренія, для усунення психомоторного збудження, що супроводжується галюцинаціями та маячними ідеями?

- А. Пірацетам
- В. Натрію оксибутират
- С. Налоксон
- Д. Аміназин
- Е. Димедрол

45. У якій лабораторії проводиться дослідження носоглоткових змивів на грип та ГРВІ?

- А. Вірусологічний
- В. Бактеріологічний
- С. Імунологічний
- Д. Біохімічний
- Е. Клінічний

46. Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого пієлонефриту?

- А. Тахікардія, сеча кольору «м'ясних помий»
- В. Гіпертензія, набряки
- С. Анурія, свербіж шкіри
- Д. —
- Е. Гарячка, біль у поперековій ділянці

47. Працівники, які обслуговують каналізаційну мережу, відчували в повітрі специфічний запах «тухлих яєць». За одну годину після цього в них з'явилися слюзотеча, різи в очах, кашель, нежить, задишка, біль у грудях, головний біль, запаморочення, нудота. Для отруєння якою хімічною речовиною характерні ці симптоми?

- А. Аміаком
- В. Хлором
- С. Сірководнем
- Д. Вуглецю оксидом
- Е. Фосгеном

48. Вкажіть шлях введення контрастної речовини в кровеносне русло під час проведення холецистографії?

- А. Сублінгвально
- В. Підшкірно
- С. Внутрішньошкірно
- Д. Внутрішньом'язово
- Е. Внутрішньовенно

49. У жінки в терміні вагітності 33 тижні спостерігається збільшення маси тіла — 500 г за тиждень та підвищення АТ — 150/90 мм рт. ст. Яке додаткове лабораторне дослідження треба провести жінці насамперед?

- А. Визначення білка в сечі
- В. Бактеріологічне дослідження сечі
- С. Коагулограма
- Д. Біохімічний аналіз крові
- Е. Загальний аналіз крові

50. Пацієнт ендокринологічного відділення скаржиться на прискорене серцебиття, біль у ділянці серця, погіршення сну, схуднення на тлі підвищення апе-

титу. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, тремор пальців рук, шкіра волога, тепла, температура тіла — 37,2°C, пульс — 100/хв, АТ — 150/90 мм рт. ст., екзофтальм, позитивний симптом Грефе, збільшення щитоподібної залози, тони серця звучні, систолічний шум на верхівці. Яке дослідження треба провести для визначення функції щитоподібної залози?

- A.** Загальний аналіз крові
- B.** Аналіз крові на глюкозу
- C.** МРТ головного мозку
- D.** УЗД щитоподібної залози
- E.** Аналіз крові на тиреоїдні гормони

51. Як називається спосіб комунікації, пов'язаний з використанням слів (мови) для передачі інформації?

- A.** Невербальна
- B.** Офіційна
- C.** Дистанційна
- D.** Виховна
- E.** Вербальна

52. Які процедури треба порадити пацієнту після зняття гіпсової пов'язки для відновлення функції травмованої нижньої кінцівки?

- A.** УФО
- B.** ЛФК, масаж
- C.** Зігрівальний компрес
- D.** Фототерапію
- E.** Гірудотерапію

53. Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для виявлення мікрофлори?

- A.** Фізичний
- B.** Хімічний
- C.** Бактеріологічний
- D.** Візуальний
- E.** Інструментальний

54. Які продукти треба обмежити в харчовому раціоні пацієнта, у якого виявлено здуття живота та метеоризм?

- A.** Яйця, гречану крупу
- B.** Каву, міцний чай
- C.** Капусту, бобові
- D.** Яблука, гарбуз
- E.** М'ясо, печінку

55. Під час лабораторного дослідження мокротиння виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена та еозинофіли. Для якого захворювання характерний такий результат дослідження?

ктерний такий результат дослідження?

- A.** Туберкульозу легень
- B.** Бронхоектатичної хвороби
- C.** Сухого плевриту
- D.** Гострого бронхіту
- E.** Бронхіальної астми

56. Вкажіть особливість підготовки пацієнта до проведення езофагогастродуоденоскопії.

- A.** Вранці застосувати олійну клізму
- B.** Напередодні застосувати харчову клізму
- C.** Призначити розвантажувальну дієту
- D.** Дослідження проводиться натще
- E.** За 1 годину до обстеження треба випити барій

57. Жінка отримала опік окропом передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. Визначте площу опікового ураження.

- A.** 25%
- B.** 19%
- C.** 51%
- D.** 37%
- E.** 39%

58. Після роботи з електроприладами чоловік помітив на долоні правої руки біло-сіру пляму діаметром 4 мм. Який вид електротравми виник у чоловіка?

- A.** Знак
- B.** —
- C.** Металізація
- D.** Електроофтальмія
- E.** Опік

59. Який засіб контрацепції використовується для запобігання незапланованої вагітності та інфікування захворюваннями, що передаються статевим шляхом?

- A.** Шийковий ковпачок
- B.** Сперміциди
- C.** Хірургічна стерилізація
- D.** Внутрішньоматкова спіраль
- E.** Презерватив

60. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 800 000 ОД антибіотика (флакон містить 1 000 000 ОД). Сестра медична розчинила його у співвідношенні 1 : 2 (1 мл розчинника на 200 000 ОД антибіотика). Який об'єм лікарського засобу треба увести пацієнту внутрішньом'язово?

- A. 5 мл
- B. 3 мл
- C. 4 мл
- D. 10 мл
- E. 8 мл

61. У жінки на другий день після діагностичного вишкрібання порожнини матки підвищилася температура тіла до 38°C, з'явилися біль унизу живота та слизово-гнійні виділення з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: матка збільшена, болюча, м'яка. Яка з наведених нижче груп лікарських засобів використовується для лікування цього ускладнення?

- A. Глюкокортикоїди
- B. Гемостатики
- C. Седативні
- D. Цитостатики
- E. Антибактеріальні

62. Яке положення тіла потрібно надати шестирічній дитині, у якої після введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок?

- A. На спині, з повернутою на бік головою
- B. Напівсидяче
- C. На животі
- D. На лівому боці
- E. На спині, з припіднятими ногами

63. Пацієнтка після апендектомії скаржиться на дворазове блювання, затримку газів і відсутність випорожнень. Об'єктивно спостерігається: шкіра землистого кольору, язик сухий, обкладений білим нальотом, передня черевна стінка напружена. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки в ранньому післяопераційному періоді?

- A. Гострий аднексит
- B. Гострий холецистит
- C. Гострий перитоніт
- D. Гострий панкреатит
- E. Парез кишечника

64. Під час обстеження роділлі виявлено, що спинка плода обернена до правої стінки матки, над входом у малий таз розташована м'яка частина плода, яка не балотує і не має чітких контурів. Яке розташування плода у порожнині матки?

- A. Перша позиція, тазове передлежання
- B. Друга позиція, тазове передлежання
- C. Задній вид, тазове передлежання
- D. Задній вид, головне передлежання
- E. Друга позиція, головне передлежання

65. У пологовому будинку новонародженій дитині на 3-й день життя заплановано проведення щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ. Який спосіб введення цієї вакцини?

- A. Внутрішньовенно
- B. Внутрішньом'язово
- C. Внутрішньошкірно
- D. Перорально
- E. Підшкірно

66. Яка кровотеча супроводжується виділенням яскраво-червоної пінистої крові під час кашлю?

- A. Кишкова
- B. Шлункова
- C. Носова
- D. —
- E. Легенева

67. Під час парентерального введення камфорової олії сестра медична після введення шприца відтягнула його поршень на себе. Профілактику якого ускладнення вона виконала?

- A. Повітряної емболії
- B. Некрозу
- C. Медикаментозної емболії
- D. Гематоми
- E. Інфільтрату

68. Пацієнт скаржиться на біль у надлобковій ділянці, бажання випорожнити сечовий міхур, сечовиділення відсутнє упродовж 12 год. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- A. Ниркова колька
- B. Поліурія
- C. Гостра затримка сечі
- D. Олігурія
- E. Ніктурія

69. Який тип мінеральної води треба порекомендувати вживати пацієнту, у якого під час обстеження виявлено наявність сечокислих каменів у нирках?

- A. Вуглекислу
- B. Сірководневу
- C. Гідрокарбонатну (лужну)
- D. Сульфатну
- E. Хлоридну

70. Пацієнту з діагнозом: неврастенія, гіперстенічна форма, призначено бром-електрофорез за методикою Вермеля. Як треба розташувати електроди у цьому разі?

- A.** Один електрод між лопатками, другий — на грудну клітку
- B.** Обидва електроди між правою та лівою лопатками
- C.** Один електрод на потилицю, другий — на попереково-крижову ділянку
- D.** Один електрод між лопатками, другий — на литковій м'язи
- E.** Один електрод на низ живота, другий — на попереково-крижову ділянку

71. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, раптово виникла шлунково-кишкова кровотеча. Які гемодинамічні зміни спостерігаються у разі цього невідкладного стану?

- A.** Аритмія, АТ не змінюється
- B.** Тахікардія, підвищення АТ
- C.** Брадикардія, підвищення АТ
- D.** Брадикардія, зниження АТ
- E.** Тахікардія, зниження АТ

72. Вкажіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п'явки.

- A.** Гістамін
- B.** Гепарин
- C.** Гірудин
- D.** Лізоцим
- E.** Фібринолізин

73. Яке специфічне місцеве ускладнення інсулінотерапії виникає у разі введення інсуліну в одне й теж місце?

- A.** Абсцес
- B.** Ліподистрофія
- C.** Інфільтрат
- D.** Гематома
- E.** Некроз

74. Для якого захворювання характерним є зниження секреторної та кислотоутворювальної функцій шлунку?

- A.** Виразкової хвороби шлунку
- B.** Цирозу печінки
- C.** Хронічного гіпертрофічного гастриту
- D.** Хронічного панкреатиту
- E.** Хронічного атрофічного гастриту

75. Чоловік скаржить на сильний біль у поперековій ділянці та часті позиви до сечовипускання, нудоту. Пацієнт збу-

джний, метушливий. Під час огляду шкірні покриви бліді, симптом Пастернацького позитивний з правого боку. Яку тактику треба застосувати насамперед для полегшення стану пацієнта?

- A.** Тепло на поперекову ділянку
- B.** Уведення спазмолітичних препаратів
- C.** Уведення знеболювальних засобів
- D.** Уведення сечогінних препаратів
- E.** Холод на поперекову ділянку

76. До сімейного лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на нудоту, зниження апетиту та тупий ниючий біль в епігастральній ділянці, який виникає за 15–30 хв після вживання їжі. Захворювання пов'язує з нерегулярним харчуванням. Об'єктивно спостерігається: шкіра та слизові оболонки блідо-рожеві, язик вкритий білим нальотом. Живіт під час пальпації м'який, болючий в епігастральній ділянці. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Виразкової хвороби шлунку
- B.** Хронічного гіпоацидного гастриту
- C.** Хронічного панкреатиту
- D.** Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
- E.** Раку шлунку

77. До жіночої консультації звернулася жінка у терміні вагітності 36 тижнів. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: обвід живота — 98 см, ВСДМ — 40 см, вислуховується серцебиття — 146/хв справа вище від пупка і 160/хв зліва нижче пупка. Визначте вид вагітності.

- A.** Одноплідна
- B.** Переношена
- C.** Багатоплідна
- D.** Завмерла
- E.** Несправжня

78. Який спеціальний інструмент треба підготувати сестрі медичній для аспіраційної біопсії слизової оболонки матки?

- A.** Пайпель
- B.** Конхотом
- C.** Корцанг
- D.** Скальпель
- E.** Пінцет

79. До якої фармакологічної групи лікарських засобів відноситься діазепам?

- A. Транквілізатори
- B. Антидепресанти
- C. Антikonвульсанти
- D. Міорелаксанти
- E. Ноотропи

80. Під час догляду за пацієнтом із хронічною серцевою недостатністю сестра медична звернула увагу на збільшення маси тіла пацієнта та зменшення виділення кількості сечі. Аналіз водного балансу встановив, що добовий діурез пацієнта становить 50% від кількості прийнятої рідини. Зробіть висновок за результатами обстеження.

- A. Порушення метаболізму
- B. Зневоднення
- C. Ожиріння
- D. —
- E. Поява прихованих набряків

81. У тримісячної дитини спостерігається неспокій, плаксивість, порушення сну, підвищена пітливість, облісіння потилиці, здуття живота. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Спазмофілії
- B. Рахіту
- C. Гіпотрофії
- D. Алергічного діатезу
- E. Гіпервітамінозу D

82. До якого обстеження сестрі медичній треба підготувати пацієнта, у якого є припущення на ішемічний інсульт?

- A. Електрокардіографії
- B. Ехокардіографії
- C. Електроміографії
- D. Магнітно-резонансної томографії
- E. Рентгенографії кісток черепа

83. Опіки якого ступеня характеризуються появою пухирів різної величини, наповнених прозорою рідиною, на тлі гіперемованої шкіри?

- A. IV
- B. II
- C. I
- D. —
- E. III

84. Чоловік віком 45 років скаржиться на різкий біль у потиличній ділянці голови, запаморочення, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, обличчя гіперемоване, пульс — 92/хв, напружений, ритмічний, АТ — 190/100 мм рт. ст., тони серця ослаблені, акцент другого тону над

аортою. Який препарат використовується для надання невідкладної допомоги у цьому разі?

- A. Анальгін
- B. Димедрол
- C. Магнію сульфат
- D. Кордіамін
- E. Адреналін

85. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки в маткові труби для визначення їх прохідності або з лікувальною метою?

- A. Лапароскопія
- B. Пертубація
- C. Гідротубація
- D. Гістероскопія
- E. Кольпоскопія

86. У чотирирічної дитини спостерігаються напади спазматичного кашлю з репризами. Який матеріал треба взяти для проведення лабораторного дослідження у цьому разі?

- A. Змиви із носоглотки
- B. Промивні води бронхів
- C. Слиз методом «кашльових пластинок»
- D. Промивні води шлунку
- E. Мокротиння

87. Як називається патологічний стан, що характеризується болем у суглобі та не супроводжується запальним процесом та/або порушенням рухливості у ньому?

- A. Поліартрит
- B. Арталгія
- C. Полікістоз
- D. Артроз
- E. Артрит

88. У пацієнтки з ожирінням під час обстеження в ділянці живота та стегон виявлено надлишкове, рівномірне розподілення жирової тканини. Який це вид ожиріння?

- A. Церебральне
- B. —
- C. Гіпотиреоїдне
- D. Аліментарно-конституційне
- E. Диспластичне

89. Вкажіть прояви дизуричного синдрому.

- A.** Альбумінурія, кетонурія
- B.** Піурія, протеїнурія
- C.** Гіпертензія, набряки
- D.** Позитивний симптом Пастернацького
- E.** Часте болісне сечовипускання

90. Вкажіть віддалене ускладнення генітального туберкульозу у жінок.

- A.** Порушення менструального циклу
- B.** Підвищена пітливість
- C.** Швидка втомлюваність
- D.** Субфебрилітет
- E.** Безпліддя

91. Який метод дослідження використовується для діагностики лейкозів?

- A.** Імунологічний аналіз крові
- B.** Загальний аналіз сечі
- C.** Біохімічний аналіз крові
- D.** Стерильна пункція
- E.** Коагулограма

92. Пацієнт скаржиться на біль унизу живота та часті рідкі випорожнення (спочатку калового характеру, а потім мізерні, з домішками слизу та крові по типу «ректального плевка»). Під час пальпації живота спостерігається біль та виражений спазм у ділянці сигмоподібної кишки. З боку інших органів патології не виявлено. Який лабораторний метод діагностики треба застосувати для підтвердження діагнозу?

- A.** Копрологічний
- B.** Аналіз крові на глюкозу
- C.** Бактеріологічний
- D.** Біохімічний аналіз крові
- E.** Загальний аналіз крові

93. У дівчини за декілька місяців після початку статевого життя у ділянці великих статевих губ з'явилися сосочкоподібні розростання. Який збудник, найімовірніше, спричинив цю патологію?

- A.** Трихомонада
- B.** Хламідія
- C.** Гарднерела
- D.** Протей
- E.** Папіломавірус

94. Яка контрастна речовина використовується для ректального введення під час рентгенологічного обстеження товстої кишки?

- A.** Холевід
- B.** Біліграфін
- C.** Уротраст
- D.** Верографін
- E.** Барію сульфат

95. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено спинномозкову пункцію. Який колір ліквору характерний для цього захворювання?

- A.** Жовтувато-зеленуватий
- B.** Прозорий
- C.** Каламутний
- D.** Безбарвний
- E.** Червоний

96. Який вид анестезії використовується під час оперативного лікування підшкірного панарицію?

- A.** Інфільтраційна
- B.** Термінальна
- C.** За Оберстом-Лукашевичем
- D.** За Вишневським
- E.** Внутрішньокісткова

97. Які клінічні прояви найхарактерніші для системної склеродермії?

- A.** Маскоподібне обличчя, рот у вигляді «кисету»
- B.** Деформації пальців рук у вигляді «плавників моржа»
- C.** Кільцеподібна еритема на руках і тулубі
- D.** Параорбітальний набряк із пігментацією
- E.** Еритематозна висипка на обличчі у вигляді «метелика»

98. Пацієнту з діагнозом: гіпертонічна хвороба I ст., призначено електрофорез із 5% розчином сульфату магнію. Яка методика проведення процедури використовується у цьому разі?

- A.** Півмаска Бергоньє
- B.** Гальванічний комір за Щербаком
- C.** Електрофорез за Вермелем
- D.** Електрофорез по Келату
- E.** —

99. У юнака віком 20 років після укусу бджоли з'явилися: щільний набряк повік і губ, захриплість голосу, «гавкаючий» кашель, відчуття нестачі повітря. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, дихання утруднене, обличчя бліде та набрякле, ціаноз губ. Пульс — 86/хв, ритмічний, АТ — 120/80 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся

у пацієнта?

- A. Анафілактичний шок
- B. Астматичний стан
- C. Кропив'янка
- D. Синдром Лайєлла
- E. набряк Квінке

100. У пацієнта з діагнозом: пневмонія, підвищилася температура тіла до 39,0°C, шкіра червона, гаряча на дотик, волога. Яку тактику треба застосувати сестрі медичній для зниження температури пацієнту?

- A. Фізичні методи охолодження
- B. Поставити банки
- C. Поставити гірчичники
- D. Обкласти грілками
- E. Накласти зігрівальний компрес

101. Яке ускладнення розвивається внаслідок потрапляння олійного розчину в просвіт судини під час виконання підшкірної ін'єкції?

- A. Гематома
- B. Інфільтрат
- C. Алергічна реакція
- D. Жирова емболія
- E. Абсцес

102. Які клінічні прояви нацхарактерніші для гострого гломерулонефриту?

- A. Анурія, свербіж шкіри
- B. Гіпертензія, набряки
- C. Гіпертермія, гіпотензія
- D. Гіпотензія, біль у поперековій ділянці
- E. Гарячка, часте і болісне сечовипускання

103. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

- A. Спірографія
- B. УЗД легень
- C. Шкірні алергологічні тести
- D. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- E. Бронхоскопія

104. Жінка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, прискорене серцебиття, порушення смаку (бажання їсти крейду), блідість та сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. Для якого виду анемії характерні ці симптоми?

- A. Фолієводефіцитної
- B. Гемолітичної
- C. Залізодефіцитної
- D. B₁₂-дефіцитної
- E. Гіпопластичної

105. Який лікарський засіб використовується у разі консервативного лікування тиреотоксикозу для пригнічення секреції тиреоїдних гормонів?

- A. Преднізолон
- B. Мерказоліл
- C. Інсулін
- D. Новокаїн
- E. Глюкоза

106. Який метод дослідження сечі використовується для визначення концентраційної функції нирок?

- A. За Амбурже
- B. За Аддіс-Каковським
- C. За Нечипоренко
- D. —
- E. За Зимницьким

107. Як називається спеціалізований медичний заклад стаціонарного типу, де проводиться паліативне лікування пацієнтів із невиліковними хворобами?

- A. Амбулаторія
- B. Клініка
- C. Поліклініка
- D. Хоспіс
- E. Санаторій

108. Чоловік віком 79 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на озноб, пітливість, слабкість, задишку та появу нестерпного болю в ділянці серця, що поширюється на ліву руку та не проходить після приймання нітрогліцерину. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

- A. Пневмонії
- B. Інфаркту міокарда
- C. Стенокардії
- D. Артеріальної гіпертензії
- E. Серцевої астми

109. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей виявлено численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні «симптом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання хара-

ктерні ці клінічні прояви?

- A. Екземи
- B. Токсикодермії
- C. Дерматиту
- D. Висівкоподібного лишая
- E. Мікроспорії

110. Жінка скаржиться на гіркий присмак у роті, печію, нудоту і відрижку повітрям після вживання жирної та смаженої їжі. Для якого синдрому характерні ці клінічні прояви?

- A. Больового синдрому
- B. Шлункової диспепсії
- C. Кишкової диспепсії
- D. Інтоксикаційного синдрому
- E. Астеновегетативного синдрому

111. Пацієнт скаржиться на озноб, гарячку, профузне потовиділення, що повторюються кожні три дні. З анамнезу відомо, що тиждень тому повернувся з Африки. Об'єктивно спостерігається: температура тіла 40°C, шкіра обличчя гіперемована, у легенях жорстке дихання, живіт пальпаторно безболісний, печінка та селезінка збільшені. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Малярії
- B. Лептоспірозу
- C. Грипу
- D. Висипного тифу
- E. Вірусного гепатиту

112. Як називається метод ендоскопічного дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура?

- A. Езофагогастроуденоскопія
- B. Цистоскопія
- C. Ректороманоскопія
- D. Колоноскопія
- E. Бронхоскопія

113. Який лікарський препарат використовується насамперед під час надання невідкладної медичної допомоги пацієнту з анафілактичним шоком?

- A. Атропін
- B. Ампіцилін
- C. Епінефрин
- D. Еритроміцин
- E. Диклофенак

114. Як називається патологічний стан, що розвивається як ускладнення бронхіальної астми та характеризується повною резистентністю до бронхолітичних засобів?

- A. набряк легень
- B. Анафілактичний шок
- C. Астматичний статус
- D. Легенева кровотеча
- E. Кардіогенний шок

115. У чоловіка віком 58 років, який хворіє на цироз печінки, раптово з'явилися такі симптоми: збудження змінилося на сонливість, нудота, блювання, посмикування м'язів обличчя та кінцівок, з рота відчувається запах аміаку, температура тіла 39–40°C, спостерігається дихання Чейна-Стокса. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- A. Пенетрація
- B. Перфорація
- C. Бактеріальний перитоніт
- D. Шлункова кровотеча
- E. Печінкова кома

116. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 60 мг 4% розчину гентаміцину сульфату. В ампулах по 2 мл міститься 80 мг цього антибіотика. Скільки мілілітрів препарату треба набрати в шприц для виконання ін'єкції?

- A. 3 мл
- B. 1,5 мл
- C. 2 мл
- D. 0,5 мл
- E. 1 мл

117. До якої функціональної проби треба підготувати пацієнта зі стабільною стенокардією напруження під час виконання плану медсестринських втручань?

- A. Велоергометрії
- B. Синокаротидної проби
- C. Проби із затримкою дихання
- D. Атропінової проби
- E. Кліноортостатичної проби

118. Які заходи (дії) треба включити сестрі медичній у план догляду за пацієнтом з геморагічним інсультом?

- A. Уведення анальгетиків
- B. Зняття ЕКГ
- C. Промивання шлунку
- D. Уведення протиблювотних засобів
- E. Профілактику гіпостатичної пневмонії

119. Який розчин використовується для промивання постійного катетера Фолея?

- A. 2% р-н натрію гідрокарбонату
- B. 0,02% р-н фурациліну
- C. 5% р-н глюкози
- D. 6% р-н перекису водню
- E. 3% р-н хлораміну

120. Як називається розмір площини входу в малий таз, що проходить між крижовим мисом та серединою верхньо-внутрішнього краю лобкового симфізу?

- A. —
- B. Поперечний
- C. Прямий
- D. Косий
- E. Інтерспінальний

121. Чоловік скаржиться на періодичні закрепи, випорожнення з домішками крові та переймоподібний біль у животі. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, живіт приймає участь в акті дихання, м'який. У лівому підребер'ї пальпується щільне болюче утворення. Який інструментальний діагностичний метод використовується для обстеження всіх відділів товстого кишківника та взяття біопсії?

- A. Колоноскопія
- B. Оглядовий рентген-знімок черевної порожнини
- C. Іригоскопія
- D. Комп'ютерна томографія
- E. УЗД

122. У чоловіка віком 54 роки спостерігається головний біль, шум у вухах, запаморочення та стійке підвищення артеріального тиску (АТ — 160/100 мм рт. ст). Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- A. Інфаркт міокарда
- B. Серцева астма
- C. Ішемічний інсульт
- D. Артеріальна гіпертензія
- E. Стенокардія

123. Чим треба насамперед промити рану після укусу собаки до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- A. Мильним розчином
- B. 10% розчином натрію хлориду
- C. —
- D. Розчином фурациліну
- E. Розчином бетадину

124. Пацієнт, який збирає сечу для дослідження за методом Зимницького,

повідомив сестру медичну про те, що не може зібрати сечу в третій контейнер, у зв'язку з відсутністю позиву до сечовипускання. Яка тактика сестри медичної у цьому разі?

- A. Третій контейнер залишити порожнім
- B. Дати пацієнту випити води
- C. Застосувати методи рефлекторного виклику акту сечовипускання
- D. Увести пацієнту сечогінний препарат
- E. Виконати катетеризацію сечового міхура

125. Які параметри враховуються під час оцінювання ефективності пологової діяльності?

- A. Артеріальний тиск
- B. Серцебиття плода
- C. Температура тіла
- D. Частота, тривалість та інтенсивність перейм
- E. Частота та ритмічність пульсу

126. У чоловіка виявлено відкритий перелом середньої третини лівого стегна. Із рани пульсуючим струменем витікає кров яскраво-червоного кольору. Який тимчасовий метод спинення кровотечі потрібно застосувати в цьому разі?

- A. Максимальне згинання кінцівки в суглобі
- B. Тиснуча пов'язка
- C. Підвищене положення кінцівки
- D. Накладання артеріального джгута
- E. Туга тампонада рани

127. У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи спостерігаються гіперемія шкіри та поява дрібних пухирців із гнійним умістом, покритих жовтими кірками, піднижньощелепний лімфаденіт. Для якої патології характерні ці симптоми?

- A. Кандидозу
- B. Імпетиго
- C. Мікроспорії
- D. Фурункулу
- E. Сикозу

128. Жінці віком 35 років діагностовано залізодефіцитну анемію. Які продукти харчування мають бути у достатній кількості в раціоні харчування жінки?

- A.** Борошняні вироби
- B.** М'ясні продукти
- C.** Овочі і фрукти
- D.** Морська капуста
- E.** Молочні продукти

129. У пацієнта попередній діагноз: загострення хронічного панкреатиту. Яке дослідження проводиться для уточнення діагнозу?

- A.** Аналіз калу на приховану кров
- B.** Аналіз крові на білірубін
- C.** Аналіз сечі на α -амілазу
- D.** Аналіз крові на креатинін
- E.** Аналіз сечі на глюкозу

130. Яким способом проводиться дренивання плевральної порожнини для видалення повітря у разі пневмотораксу?

- A.** По Бюлау
- B.** Стрічковим дренажем
- C.** Трубчастим дренажем
- D.** Мікроіригатором
- E.** По Суботіну

131. Яка з наведених нижче груп лікарських засобів використовується для лікування алергічних захворювань?

- A.** Антагоністи кальцію
- B.** Антациди
- C.** Антиагреганти
- D.** Антигістамінні
- E.** Антидепресанти

132. Чоловік віком 50 років скаржиться на загальну слабкість, свербіння шкіри, тупий ниючий біль у правому підбер'ї, здуття живота, закрепи, що чергуються з діарсеєю. Об'єктивно спостерігається: збільшення печінки, судинні зірочки на шкірі, розширення венозної сітки навколо пупка, асцит, гінекомастія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Цирозу печінки
- B.** Вірусного гепатиту
- C.** Хронічного холециститу
- D.** Жовчнокам'яної хвороби
- E.** Хронічного гепатиту

133. Як називається виробничий фактор, вплив якого призводить до погіршення стану здоров'я і зниження продуктивності працівника?

- A.** Небезпечний
- B.** Оптимальний
- C.** Шкідливий
- D.** —
- E.** Допустимий

134. Жінка віком 57 років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей рук, ранкову скутість, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — $37,5^{\circ}\text{C}$, набряк і почервоніння п'ястково-фалангових і міжфалангових суглобів обох кистей та обмеження їхньої рухомості, кисті мають вигляд «ластів моржа». Який лабораторний показник найдоцільніше визначити в цьому разі?

- A.** Білірубін
- B.** Сечову кислоту
- C.** С-реактивний білок
- D.** АЛАТ, АсАТ
- E.** Ревматоїдний фактор

135. У пацієнта з інсультом спостерігається часткове обмеження довільних рухів у правих кінцівках із підвищенням м'язового тону та фізіологічних рефлексів. Який це вид рухового порушення?

- A.** Центральна геміплегія
- B.** Центральний геміпарез
- C.** Периферичний геміпарез
- D.** Периферична геміплегія
- E.** Центральний парепарез

136. Жінка після ДТП скаржиться на біль і відсутність рухів у ділянці лівої ключиці. Під час огляду виявлено вкочення лівого надпліччя, його деформацію та набряк, згладження надключичної ямки. Для якого ушкодження характерні ці симптоми?

- A.** Відкритого перелому ключиці
- B.** Перелом ключиці зі зміщенням кісткових уламків
- C.** Вивиху ключиці
- D.** Забою у ділянці ключиці
- E.** Перелому ключиці без зміщення кісткових уламків

137. Як називається порушення діурезу, що характеризується зменшенням добової кількості сечі?

- A.** Ніктурія
- B.** Дизурія
- C.** Олігурія
- D.** Полакіурія
- E.** Поліурія

138. Споживання продуктів зі збагачених вмістом якого мікроелементу треба порекомендувати пацієнту, який хворіє на хронічну серцеву недостатність?

- A. Кальцію
- B. Натрію
- C. Калію
- D. Заліза
- E. Магнію

139. Сестра медична у пологовому будинку проводить підготовку новонародженої дитини з масою тіла 2300 г до щеплення проти туберкульозу. Яку вакцину вона застосує?

- A. БЦЖ-М
- B. «Інфанрікс»
- C. «Пентаксім»
- D. «Пріорікс»
- E. БЦЖ

140. У жінки в терміні вагітності 35 тижнів з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс — 100/хв, АТ — 100/60 мм рт. ст. Матка напружена, болюча. Положення плода поздовжне, голівка передлежить над площиною входу в малий таз, серцебиття 160/хв, ритмічне. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

- A. Розрив матки, що відбувся
- B. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- C. Неповне передлежання плаценти
- D. Загроза розриву матки
- E. Аборт у ході

141. Жінку в терміні вагітності 38-39 тижнів шпиталізовано до пологового будинку. Вкажіть ознаку початку пологової діяльності у жінки.

- A. Опущення дна матки
- B. Розкриття шийки матки
- C. Біль у ділянці крижів
- D. Регулярні перейми
- E. Часте сечовипускання

142. Під час об'єктивного обстеження пацієнта сестра медична виявила, що на тлі сповільненого та рівномірного за глибиною дихання з'являються тривалі паузи (до 30 секунд). Який тип дихання спостерігається у пацієнта?

- A. Інспіраторна задишка
- B. Дихання Чейна-Стокса
- C. Дихання Куссмауля
- D. Дихання Біота
- E. Експіраторна задишка

143. Семирічна дитина скаржиться на біль в епігастрії, періодичні нудоти, відрижку повітрям, печію, відчуття важкості у шлунку. Які особливості підготовки дитини до дослідження на *Helicobacter Pylori*?

- A. Приймати проносні засоби упродовж 3-х днів до дослідження
- B. Уникати чищення зубів і полоскання рота зранку перед дослідженням
- C. Застосувати очисну клізму напередодні
- D. Припинити приймання антибіотиків за 4-6 тижнів до дослідження
- E. Перед обстеженням збільшити вживання рідини

144. У жінки на 31 тижні вагітності розпочалися пологи та з'явилася кровотеча з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: шийка матки розкрита на 8 см, внутрішнє вічко на 1/3 перекрите м'якою, губчастою тканиною, поруч пальпується навколоплідний міхур. У роділлі спостерігається активна пологова діяльність. Вкажіть вид передлежання плаценти.

- A. Низьке
- B. Бокове
- C. Оболонкове
- D. Крайове
- E. Центральне

145. Чоловік скаржиться на раптову появу висипу на шкірі та свербіж після вживання полуниці. Під час огляду на шкірі тулуба та кінцівок виявлено червоні плями, пухирі різних розмірів, подряпини, АТ — 120/80 мм рт.ст, пульс — 82 уд/хв. Яке захворювання розвинулося у чоловіка?

- A. Кропив'янка
- B. Геморагічний васкуліт
- C. Набряк Квінке
- D. Короста
- E. Анафілактичний шок

146. У чоловіка після значного фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій ділянці, що іррадіює вниз живота, часте болісне сечовипускання, виділення кров'янистої сечі. Пацієнт збуджений, спостерігається блювання. Який патологічний стан

розвинувся у пацієнта?

- A.** Гостра затримка сечі
- B.** —
- C.** Харчове отруєння
- D.** Напад ниркової кольки
- E.** Напад жовчної кольки

147. Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться введенням вакцини БЦЖ внутрішньошкірно. Яке ускладнення розвивається у разі випадкового потрапляння вакцини під шкіру?

- A.** «Холодний абсцес»
- B.** Інфільтрат
- C.** Ліподистрофія
- D.** Виразка
- E.** Олійна емболія

148. Під яким кутом вводиться голка у верхньо-зовнішній квадрант сідниці під час виконання внутрішньом'язової ін'єкції?

- A.** 15°
- B.** 90°
- C.** 70°
- D.** 45°
- E.** 30°

149. Породілля в ранньому післяпологовому періоді перебуває в пологовій залі. Як часто треба виконувати зовнішній масаж матки для профілактики кровотечі?

- A.** Кожні 60 хвилин
- B.** Кожні 10 хвилин
- C.** Кожні 5 хвилин
- D.** Кожні 30 хвилин
- E.** Кожні 15 хвилин

150. На яку глибину вводиться газівідвідна трубка в пряму кишку дорослим пацієнтам для усунення метеоризму?

- A.** 3–4 см
- B.** 20–30 см
- C.** 10–15 см
- D.** 15–20 см
- E.** 5–10 см